




ALBENE

INSETTICIDA A BASE DI OLIO DI PARAFFINA I (EMULSIONE OLIO IN ACQUA)

- Agisce per contatto e per asfissia.
- Particolarmente indicato nella lotta alle Cocciniglie o Diaspini, e le forme svernanti o primaverili-estive degli Acari.
- Attività abbattente nei trattamenti invernali, ad alti dosaggi.
- Come coadiuvante dei trattamenti estivi, a bassi dosaggi.



Applicazione sulla pianta



COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)

OLIO DI PARAFFINA CAS 8042-47-5 g 78,1 (= 654 g/l)



REGISTRAZIONE

n. 0206 del 20/11/1971



CLASSIFICAZIONE

CLP  H411



FORMULAZIONE

Emulsione concentrata



CONFEZIONI

1 litro (Cartone: 12x1)
5 litri
25 litri
1000 litri



CARENZA

20 giorni



MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Impiegare ALBENE con un intervallo di almeno 20 giorni dopo aver effettuato trattamenti con poltiglia bordolese, polisolfuri e prodotti contenenti captano, zolfo, tiram. Su piante ornamentali, data la notevole varietà di specie presenti, si consiglia di effettuare saggi preliminari prima di trattare l'intera superficie.



COLTURE



PATOGENI



DOSE



NOTE

COLTURE	PATOGENI	DOSE	NOTE
POMACEE	Cocciniglie (<i>Q. Perniciosus</i> , <i>E. leperii</i> , ecc.), Afidi (<i>A. pomi</i> , <i>D. plantaginea</i> , <i>D. pyri</i> , ecc.), Acari (<i>P. ulmi</i>).	0,75-1,0 l/hl (10,0 L/ha impiegare volumi di acqua di 800-1000 L/ha).	Nei trattamenti di fine inverno-inizio primavera fino alla pre-fioritura, normalmente in corrispondenza della fase fenologica delle orecchiette di topo del melo e dei "mazzetti affioranti" per il pero. Effettuare 1 trattamento/anno.
DRUPACEE	Cocciniglie (<i>P. pentagona</i> , <i>Q. perniciosus</i> , <i>E. corni</i> , ecc.), Afidi (<i>Myzus spp.</i> , <i>H. amygdali</i> , <i>Brachycaudus spp.</i> , ecc.), Ragnetto rosso (<i>P. ulmi</i>).	0,75-1,0 L/hl (10,0 L/ha distribuire con un volume di 800-1000 L/ha di acqua).	Nei trattamenti di fine inverno, normalmente dalla fase fenologica di "gemma rigonfia" a "bottoni rosa". Effettuare 1 trattamento/anno.
AGRUMI	Cocciniglie (<i>C. hesperidium</i> , <i>S. oleae</i> , <i>P. pergandei</i> , <i>A. aurantii</i> , <i>I purchasi</i> , <i>Ceratoplastes spp.</i> , ecc.) e la mosca bianca (<i>Dialeurodes citri</i> , <i>Aleurothrix floccosus</i> , ecc.s)	1,0-1,5 L/hl (20-45 L/ha impiegare volumi di acqua di 2000-3000 L/ha).	Nei trattamenti invernali e primaverili-estivi fino all'ingrossamento dei frutti. Effettuare massimo 2 interventi/anno con un intervallo di almeno 14 giorni.
VITE	Cocciniglie (<i>T. vitis</i> , <i>P. vitis</i> , ecc.), Ragnetto rosso (<i>P. ulmi</i>), Ragnetto giallo (<i>E. carpini</i>), Afidi.	1,0 l/hl (5,0-12 L/ha distribuendo un volume di 500-1200 L/ha di acqua).	Nei trattamenti di fine inverno-inizio primavera (fino all'ingrossamento delle gemme). Effettuare 1 trattamento/anno.
PIANTE ORNAMENTALI	Cocciniglie (<i>P. pentagona</i> , ecc.) e il Ragnetto rosso (<i>T. urticae</i> , <i>P. ulmi</i>), Afidi.	1,0-2,0 L/hl (4,0-40,0 L/ha impiegando volumi di acqua di 400-2000 L/ha).	Nei trattamenti invernali e alla ripresa vegetativa. Effettuare massimo 2 trattamenti/anno.