



MICROTHIOL® DISPERSS®

MICROTHIOL® DISPERSS® è il prodotto leader nel segmento degli zolfi microgranulari, idoneo per il controllo degli oidi. Il formulato DISPERSS® di tecnologia esclusiva UPL garantisce rapida dispersione ed elevata sospensibilità anche a ridotti volumi d'acqua. L'assenza di schiuma e polveri consente un'ampia miscibilità con i più comuni agrofarmaci.



COMPOSIZIONE Zolfo puro 80%











FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili

INTERVALLO DI SICUREZZA 5 gg.



N° DI REGISTRAZIONE 1583 del 04.09.1974

CONFEZIONE kg 15

INDICAZIONI DI PERICOLO EUH401

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (g/hL)	NOTE
 Vite	Oidio	200 - 400	All'insorgere della malattia o in caso di modesti attacchi.
		800	In situazioni mediamente gravi.
		1200	In caso di forte pressione della malattia.
 Pomacee	Oidio	200 - 500	In trattamenti pre-fiorali.
		200 - 300	In trattamenti post-fiorali.
 Drupacee	Oidio	200 - 600	Irrorando con la dose più alta in trattamenti estintivi di post-raccolta.
 Mandorlo e Nocciolo	Oidio	200 - 500	Le dosi più alte vanno impiegate in caso di forte pressione della malattia.
 Fragola	Oidio	200 - 500	Le dosi più alte vanno impiegate in caso di forte pressione della malattia.
 Ortaggi (Aglio, Cipolla, Peperone, Melanzana, Cavoli, Fagioli, Piselli, Finocchio, Carciofo, Zucchini, Cetriolo, Melone, Cocomero, Pomodoro)	Oidio	200 - 500	Le dosi più alte vanno impiegate in caso di forte pressione della malattia. Sul cetriolo impiegare alla dose di 200 g/hL Sul pomodoro i dosaggi potranno essere elevati fino a 750 g/hL.
 Patata	Oidio	200 - 500	Le dosi più alte vanno impiegate in caso di forte pressione della malattia.
 Cereali	Oidio	8 kg/ha	Intervenire quando la malattia colpisce la penultima foglia.
 Barbabietola da zucchero	Oidio	8-10 kg/ha	Effettuare un primo trattamento alla comparsa della malattia ed un secondo 20 giorni dopo.
 Oleaginose (Soia e Girasole)	Oidio	4 kg/ha	

Ⓜ - Maggiori dettagli a pag.9

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (g/hL)	NOTE
 Forestali, ornamentali e floreali	Oidio	150 - 500	Le dosi più alte vanno impiegate in caso di forte pressione della malattia.
 Tabacco	Oidio	4kg/ha	

FORMULAZIONE DISPERSS®




**OTTIMA
DISPERSIBILITÀ**



**PERFETTA
MISCIBILITÀ**



**NO
POLVERE**



**NO
SCHIUMA**



- **Dispersione immediata ed eccellente sospensibilità**
- **Elevata efficacia e selettività**
- **Assenza di schiuma e polvere**
- **Utilizzabile in agricoltura biologica**

