

SEVERAL®



COMPOSIZIONE

Piretrine pure 2 % (= 18,61 g/l)

INSETTICIDA A BASE DI PIRETRO NATURALE

REGISTRAZIONE	FORMULAZIONE	MISCIBILITÀ	PALLET (kg/l)	CONFEZIONI	INDICAZIONI DI PERICOLO CLP
N° 13285 del 18-09-2006	SL Liquido (concentrato) solubile in acqua	—	384	1 L	 ATTENZIONE H410, EUH401
BUFFER ZONE	GRUPPO IRAC	TRASPORTO ONU	CLASSIFICAZIONE ADR	MARCHIO REGISTRATO	
5 metri da corpi idrici superficiali pomodoro, melanzana, peperone, fragola, ornamentali, 10 m piccoli frutti, 15 m vite, 20 m agrumi, 20 m pomacee con riduzione deriva 60% - da terre non coltivate: 5 m vite, 15 m agrumi, pomacee, drupacee.	3A	3082	9	Copyr S.p.A.	Copyr S.p.A.

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	n. trattamenti
Agrumi (Arancio, Limone, Mandarino)	Afidi, Mosca Bianca (Aleurodidi)	2,4 l/ha max 160 ml/hl (fino a 1500 l/ha d'acqua)	I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Intervallo minimo di 7 giorni tra un'applicazione e l'altra. Ripetere il trattamento se necessario.	1 gg	3
Pomacee (Melo, Pero)	Afidi (<i>Aphis pomi</i>)	2,4 l/ha max 160 ml/hl (fino a 1500 l/ha d'acqua)	I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Intervallo minimo di 7 giorni tra un'applicazione e l'altra. Ripetere il trattamento se necessario.	1 gg	3
Drupacee (Pesche, Prugne, Ciliegie, Albicocche)	Afidi (<i>Myzus persicae</i>), <i>Drosophila suzukii</i>	2,4 l/ha max 160 ml/hl (fino a 1500 l/ha d'acqua)	I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Intervallo minimo di 7 giorni tra un'applicazione e l'altra. Ripetere il trattamento se necessario.	7 gg	3
Vite (uva da vino e uva da tavola)	Tignola (<i>Clysia ambiguella</i>), Tignoletta (<i>Lobesia botrana</i>), Cicaline (<i>Scaphoideus titanus</i> , <i>Empoasca vitis</i>)	2,4 l/ha max 160 ml/hl (fino a 1500 l/ha d'acqua)	I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Intervallo minimo di 7 giorni tra un'applicazione e l'altra. Ripetere il trattamento se necessario. In caso di presenza di Flavescenza dorata, valutare se ripetere il trattamento in funzione del monitoraggio di <i>Scaphoideus titanus</i> .	1 gg	3
Fragola (pieno campo)	Tripidi, <i>Drosophila suzukii</i>	1,6 l/ha max 160 ml/hl (fino a 1000 l/ha d'acqua)	I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Intervallo minimo di 7 giorni tra un'applicazione e l'altra. Ripetere il trattamento se necessario.	2 gg	3
Piccoli frutti (Lampone, Mirtillo, Mora, Ribes in pieno campo)	<i>Drosophila suzukii</i>	1,28 l/ha max 160 ml/hl (fino a 800 l/ha d'acqua)	I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Intervallo minimo di 7 giorni tra un'applicazione e l'altra. Ripetere il trattamento se necessario.	2 gg	3
Ortaggi a foglia, Erbe fresche e fiori commestibili* (pieno campo e serra)	Afidi	1,28 l/ha max 160 ml/hl (fino a 800 l/ha d'acqua)	I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Intervallo minimo di 7 giorni tra un'applicazione e l'altra. Ripetere il trattamento se necessario.	1 gg	3
Patata	Dorifora (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0,96 l/ha max 160 ml/hl (fino a 600 l/ha d'acqua)	I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Intervallo minimo di 7 giorni tra un'applicazione e l'altra. Ripetere il trattamento se necessario.	—	3

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	n. trattamenti
Pomodoro, Peperone, Melanzana (pieno campo e serra)	Mosca Bianca (Aleurodidi), Tripidi	1,92 l/ha max 160 ml/hl (fino a 1200 l/ha d'acqua)	I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Intervallo minimo di 7 giorni tra un'applicazione e l'altra. Ripetere il trattamento se necessario.	1 gg	3
Cucurbitacee (Zucchini, Melone in pieno campo)	Afidi	1,28 l/ha max 160 ml/hl (fino a 800 l/ha d'acqua)	I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Intervallo minimo di 7 giorni tra un'applicazione e l'altra. Ripetere il trattamento se necessario.	1 gg	3
Floreali e ornamentali (pieno campo e serra)	Afidi, Tripidi, Mosca bianca (Aleurodidi)	1,6 l/ha max 160 ml/hl (fino a 1000 l/ha d'acqua)	I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Intervallo minimo di 7 giorni tra un'applicazione e l'altra. Ripetere il trattamento se necessario.	—	2

PHI: Tempo di carenza

Indicazioni per il corretto impiego - Per le colture a taglio (quali lattuga e altre insalate) il numero massimo di trattamenti è riferito al taglio. Utilizzare volumi d'acqua e pressioni adeguate per ottenere una buona copertura della vegetazione. Curare in modo particolare la pagina inferiore delle foglie nel caso di Aleurodidi (Mosca bianca) e Tripidi.

Prima dell'utilizzo controllare il pH dell'acqua e, nel caso sia superiore a 7, provvedere ad acidificarla. La soluzione pronta all'uso deve avere un pH pari a circa 5-6 in quanto tale livello di acidità migliora l'efficacia del prodotto e ne aumenta la persistenza d'azione. È pertanto consigliabile procedere eventualmente all'acidificazione della soluzione fino al raggiungimento del valore sopra indicato, accertandosi di non scendere sotto il valore di pH 5.

*Lattughe e insalate (Dolcetta/valerianella/gallinella, Lattughe, Scarola/indivia a foglie larghe, Crescione e altri germogli e gemme, Barbarea, Rucola, Senape juncea, Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), Foglie di spinaci e simili (Spinaci, Portulaca/porcellana, Bietole da foglia e da costa), Foglie di vite e specie simili, Crescione acquatico, Cicoria Witloof/cicoria belga, Erbe fresche e fiori commestibili (Cerfoglio, Erba cipollina, Foglie di sedano, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico e fiori commestibili, Foglie di alloro/lauro, Draguncello, Altri)

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Si raccomanda di risciacquare il contenitore vuoto almeno due volte. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 5 metri per pomodoro, melanzana, peperone, fragola, ornamentali, 10 m piccoli frutti, 15 m vite, 20 m agrumi, 20 m e utilizzo di ugelli che riducano la deriva del 60% per pomacee/drupacee. In alternativa 0 m con utilizzo di misure di mitigazione, quali ugelli anti-deriva, siepe, trattamento verso l'interno dell'ultima fila che riducano la deriva del 73% per pomodoro, melanzana, peperone, fragola, ornamentali, 86% piccoli frutti, 90,4% vite, 90,8% agrumi, 95,5% pomacee/drupacee.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza da terre non coltivate di 5 m per vite, 15 m per agrumi, pomacee e drupacee. In alternativa 0 m con utilizzo di misure di mitigazione, quali ugelli anti-deriva, siepe, trattamento verso l'interno dell'ultima fila che riducano la deriva del 55% per vite, 88,5% agrumi, pomacee e drupacee. Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non utilizzare in luoghi con forte presenza di api. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. Eliminare le piante infestanti prima della fioritura. Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione.

Consulta l'etichetta ministeriale per maggiori informazioni