

# ||||| Douro® 100 EC

**Fungicida sistemico ad azione preventiva, curativa e bloccante per colture arboree, orticole e ornamentali.**

**Douro® 100 EC** è un fungicida appartenente alla famiglia chimica dei triazoli, attivo nei confronti dell'Oidio della Vite e di numerose altre colture. Attivo nei confronti dell'oidio del melo, della vite e di numerose altre colture ed agisce anche nei confronti della ticchiolatura delle pomacee.

La sua attività sistemica ha un'azione preventiva, curativa e bloccante. Il prodotto viene assorbito in poche ore anche in condizioni ambientali difficili.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Penconazolo puro 10,20% (100 g/l)	3 gruppo G1	Concentrato Emulsionabile (EC)	 <b>PERICOLO</b> Registrazione n°: 16034 del 30/07/2014



Flaconcino: 0,25 L  
 Cartone: 24x0,25 L  
 Pallet: 500 L



Flacone: 1 L  
 Cartone: 12x1 L  
 Pallet: 600 L

Visita  
 la pagina  
 prodotto!



**EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO**

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (ml/hl)			EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI / ANNO	PHI (gg)
		PREVENTIVI	CURATIVI	BLOCCANTI			
VITE DA VINO	Oidio ( <i>Uncinula necator</i> )	25-30	-	-	Pre e post fioritura	Ogni 14-16 gg	14
VITE DA TAVOLA	Black rot ( <i>Guignardia bidwelii</i> )	15-20	-	-		Ogni 7-10 gg	
VITE DA VINO	<i>Pseudopezia</i> spp.	-	50	-	Attacchi in atto alla comparsa dei primi sintomi	2 Ogni 5-7 gg	
MELO	Ticchiolatura ( <i>Venturia inaequalis</i> )	30-40	-	-	Fino alla fase di frutto noce	Ogni 5-7 gg"	
		-	35-40	-	entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante	-	
		-	-	35-40	in presenza di sintomi	2 Ogni 7 gg	
	Oidio ( <i>Podosphaera leucotricha</i> )	30-40	-	-	in primavera in estate	Ogni 10 gg Ogni 10-14 gg	
		-	-	30-35	in presenza di sintomi	3 Ogni 7 gg	
Malattie da conservazione ( <i>Monilia fructigena</i> , <i>Penicillium</i> spp., <i>Muffa grigia</i> )		35-40			Pre-raccolta	3 Ogni 7 gg	
PERO	Ticchiolatura ( <i>Venturia pyrina</i> )	25-35	-	-	In condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della malattia	Ogni 10-12 gg	
		-	30-40	-	entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante	-	
	Ticchiolatura ( <i>Venturia pyrina</i> )	-	-	30-40	-	2 Ogni 5-7 gg	
PESCO (incluso NETTARINE e IBRIDI SIMILI)	Oidio	40-50	-	-	Dalla caduta dei petali	Ogni 10-14 gg	
	Malattie da conservazione ( <i>Monilia fructigena</i> , <i>Penicillium</i> spp., <i>Gloeosporium</i> , <i>Muffa grigia</i> )		50			Pre-raccolta	2-3 Ogni 7 gg
TABACCO	Oidio	35-50	-	-	Alla comparsa dei sintomi	2-4 Ogni 10-14 gg	
MELONE, ZUCCA, ZUCCHINO, CETRIOLO, PEPERONE, POMODORO (campo)	Oidio	25-50	-	-	Applicare in via preventiva o alla comparsa dei primi sintomi	2-4 Ogni 12-14 gg	
COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE	Oidio e Ruggini	25-50	-	-	-	Ogni 10-14 gg	

**VANTAGGI**

- Su vite esplica un effetto collaterale a azione di contenimento contro Black rot (*Guignardia bidwelii*).
- E' inserito nei Disciplinari di produzione integrata.
- Grazie all'ottima miscibilità, **Douro®100 EC** è un partner ideale di prodotti ad azione specifica in strategie antiresistenza.
- L'efficacia del trattamento garantiscono una produzione di qualità per uve destinate alla vinificazione.