



Inquadra il QRcode e scarica l'etichetta aggiornata

Culture	Principali avversità controllate	Dosi	N° max tratt. annui	Int. di sicurezza
Pomodoro	<p>Infestanti graminacee sensibili: avena selvatica (<i>Avena</i> spp.), sanguinella (<i>Digitaria</i> spp.), giavone (<i>Echinochloa</i> spp.), panico delle risaie (<i>Panicum dichotomiflorum</i>), panico coltivato (<i>Panicum miliaceum</i>), scagliola (<i>Phalaris</i> spp.), panicastrella (<i>Setaria</i> spp.), sorghetta (<i>Sorghum bicolor</i> e <i>Sorghum halepense</i> da seme e da rizoma).</p> <p>Infestanti a foglia larga sensibili: cencio molle (<i>Abutilon theophrasti</i>), amaranto (<i>Amaranthus</i> spp.), ambrosia (<i>Ambrosia</i> spp.), visnaga maggiore (<i>Ammi majus</i>), forbicine (<i>Bidens bipinnata</i>), borsa del pastore (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), vilucchio (<i>Convolvulus arvensis</i>), vilucchio bianco (<i>Calystegia sepium</i>), ruola violacea (<i>Diploaxis</i> spp.), fumaria (<i>Fumaria officinalis</i>), galinsoga (<i>Galinsoga parviflora</i>), topinambur (<i>Helianthus tuberosus</i>), camomilla comune (<i>Matricaria chamomilla</i>), menta campestre (<i>Mentha arvensis</i>), Orbanche spp., aspraggine comune (<i>Picris echioides</i>), ranuncolo (<i>Ranunculus</i> spp.), miagro peloso (<i>Rapistrum rugosum</i>), senape selvatica (<i>Sinapis arvensis</i>), crespino (<i>Sonchus</i> spp.) e nappola (<i>Xanthium</i> spp.)</p>	<p>50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Codacide. In presenza di <i>Solanum nigrum</i> applicare 50 g/ha di Executive + Codacide entro e non oltre lo stadio cotiledonare dell'infestante, ripetendo il trattamento dopo 7-10 giorni.</p> <p>In presenza di farinello (<i>Chenopodium</i> spp.), correggiola (<i>Polygonum</i> spp.) e erba porcellana (<i>Portulaca oleracea</i>) è opportuna la miscela con prodotti a base di metribuzin alle dosi consigliate.</p> <p>Con infestazione di giavone (<i>Echinochloa</i> spp.) applicare 50-60 g/ha di Executive + Codacide, in caso di reinfestazioni successive, effettuare un secondo trattamento con 30 g/ha di Executive + Codacide a distanza di 7-10 giorni.</p> <p>In presenza di Orbanche spp. prevedere da 2 a 3 interventi tramite distribuzione in manichetta a dosi variabili tra 30 e 50 g/ha per un totale massimo di 110 g/ha. La prima applicazione dovrà avvenire all'apertura del primo palco florale, le applicazioni successive dovranno essere effettuate ad un intervallo di 10-15 giorni dalla prima.</p>	2 (3 solo su orbanche)	30 giorni
Patata		50-60 g/ha con aggiunta di bagnante quando la cultura ha un'altezza media di 10-20 cm. In caso di reinfestazioni successive il trattamento può essere ripetuto utilizzando 30 g/ha di Executive.	2	30 giorni

CARATTERISTICHE:

Erbicida non residuale di post-emergenza per patata e pomodoro, attivo sia su infestanti graminacee, annuali e perenni, che su importanti dicotiledoni. Executive® contiene rimsulfuron, solfanilurea attiva per assorbimento fogliare e successiva traslocazione sistemica ai meristemi apicali dove, nelle specie sensibili, viene inibita la divisione cellulare. L'effetto visivo si osserva dopo 1-3 settimane dal trattamento, anche se la crescita cessa poche ore dopo l'applicazione. Le piante, che eventualmente non disseccano, avranno comunque uno sviluppo ridotto.



Registrazione: N° 14294 del 26/06/2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

COMPOSIZIONE:

Rimsulfuron p.a. puro 25 g
Coformulanti q. b. 100 g
Contiene fosfato disodico

FORMULAZIONE:

Granuli idrodispersibili

CONFEZIONE:

Barattolo con dosatore da 100 g
Barattolo con dosatore da 500 g

CONTENUTO PALETTA:

135 x 10 x 0,1
27 x 10 x 0,5

CLASSIFICAZIONE:



ATTENZIONE

GRUPPO HRAC	1	ERBICIDI
GRUPPO WSSA	2	