

Folicur® WG

Folicur WG è un formulato in granuli sistemico, ad ampio spettro d'azione, con attività preventiva e curativa.



Folicur® WG

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE g/100 litri	MODALITÀ D'IMPIEGO	TEMPO di CARENZA gg
Melo Pera	Ticchiolatura Oidio Maculatura bruna	40-60	Ogni 7-14 giorni.	14
Pesco Nettarino Albicocco Ciliegio	Monilia Oidio Botrite	50-75	Ogni 7 giorni.	7
Susino	Monilia, Botrite, Ruggine	50-75	Ogni 7 giorni.	7
Vite da vino	Oidio	40	Ogni 10-14 giorni.	14
Cetriolo Zucchini Pomodoro Peperone	Oidio	50	Ogni 7-10 giorni.	3
Melone Anguria Carciofo	Oidio	50	Ogni 7-10 giorni.	7
Asparago	Oidio Ruggini Stemfiliosi	50	Ogni 7-10 giorni.	-
Frumento Orzo	Mal del piede Oidio Septoria Ruggini Fusarium	1 kg/ha	-	Fino a fine fioritura
Tappeti erbosi	<i>Microdochium nivale</i> <i>Sclerotinia homeocarpa</i> <i>Rhizoctonia solani</i>	1,5-2 kg/ha	Ogni 10-20 giorni.	-



24 x 500 g



Composizione: Tebuconazolo 25%

Formulazione: Granuli idrosospensibili

Classificazione: ATTENZIONE

Registrazione: n. 8498 del 30.03.1994

® - Marchio registrato