



VENTUREX 400 SC

FUNGICIDA ENDOTERAPICO TRANSLAMINARE E DI CONTATTO
IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

- Possiede azione **preventiva** e **curativa**.
- Attivo contro **ticchiolatura** delle pomacee e malattie di ciliegio, pesco/nettarine, olivo (da tavola e da olio) e pioppo.
- **Praticità** di impiego.



Applicazione
sulla pianta



COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)

DODINIA pura g 39,4 (= 400 g/l)



REGISTRAZIONE

N° 11908 del 19/12/2003



CLASSIFICAZIONE

CLP



H315-H318-H331-H410



FORMULAZIONE

Sospensione concentrata



CONFEZIONI

Flacone: 1 litro (Cartone: 12x1)
Tanica 5 litri (Cartone: 4x5)



CARENZA

75 giorni per pesco – **40 giorni** per melo, pero, cotogno, nespolo
14 giorni per ciliegio – **7 giorni** per olivo



MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Non miscelare a prodotti a reazione alcalina, dimetoato, concimi fogliari minerali o a base di acidi umici. Miscele con emulsioni concentrate e oli minerali può dare luogo a scarsa sospensibilità e a fenomeni di sensibilizzazione delle colture. Può provocare rugginosità su mele golden delicious se impiegato prima dello stadio frutto noce. Non trattare con temperature prossime allo zero.



COLTURE



PATOGENI



DOSE



NOTE

POMACEE (MELO, PERO, COTOGNO, NESPOLO)	Ticchiolatura	Preventivi: 80-100 ml/hl Curativi: 100-120 ml/hl	Effettuare al massimo 1-2 trattamenti annui distanziati di almeno 7/14 gg. Non distribuire più di 1,7l/ha di prodotto per trattamento. Volume distribuzione 200 -1500 l/ha; non trattare in fioritura.
CILIEGIO	Antracnosi, Cilindrosporiosi azione collaterale contro <i>Botrytis</i> e <i>Monilia</i>	Preventivi: 100-120 ml/hl	Effettuare al massimo 1-2 trattamenti annui, subito dopo la fioritura, distanziati di almeno 7/10 gg. Non distribuire più di 1,7 l/ha di prodotto per trattamento. Volume distribuzione 500 -1500 l/ha.
PESCO E NETTERINE	Bolla, Corineo, <i>Fusicoccum</i> , <i>Cytospora</i>	Al bruno: 150 ml/hl In vegetazione: 100 ml/hl	Effettuare al massimo 1-2 trattamenti annui, distanziati di almeno 7/10 gg, nel periodo compreso tra rigonfiamento gemme e fine fioritura (caduta petali) e tra caduta foglie e rigonfiamento gemme. Non distribuire più di 2,25 l/ha di prodotto per trattamento. Volume distribuzione 500 -1500 l/ha.
	Monilia	Durante la fase Fioritura/caduta petali: 100-150 ml/hl Con andamento stagionale piovoso trattamenti preventivi dopo la raccolta fino a caduta foglie	
OLIVO (DA TAVOLA E DA OLIO)	Occhio di pavone, Antracnosi	Dallo sviluppo fogliare fino a inizio fioritura: 100-170 ml/hl. Autunnale (per olio da tavola usare solo post-raccolta): 100-170 ml/hl	Effettuare al massimo 1-2 trattamenti annui, distanziati di almeno 7 gg. Non distribuire più di 2,25 l/ha di prodotto per trattamento. Volume distribuzione 1000 l/ha; non trattare in fioritura.
PIOPPO	<i>Marssonina brunea</i>	Preventivi : 80-100 ml/hl Curativi : 120-150 ml/hl	Effettuare 2 trattamenti ad intervallo di 20 giorni. Non distribuire più di 2,25 l/ha di prodotto per trattamento. Volume distribuzione 1000 l/ha;

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.