

Subvert™

FEROMONE PER LA CONFUSIONE SESSUALE DELLA TIGNOLETTA DELLA VITE
(*Lobesia botrana*)

Sospensione di capsule(CS)

Subvert Authorization number: 17572 del 19.11.2020

COMPOSIZIONE:

(E,Z)-7,9-Dodecadien-1-il acetato: 18.85 % p/p(=185.5 g/L)

Coformulanti: q.b.a100 % p/p

Contiene 2- (2H-1,2,3-benzotriazol-2-il) -4-metilfenolo e 2,3-diidro-1,2-benzotriazol-3-one.

Titolare dell'autorizzazione e distributore:

Suterra Europe Biocontrol S.L.

Plaza América 2, planta 9, 46004 Valencia (Spagna)

Tel: +34 963 956 743

Suterra®

Stabilimento di
produzione:

Suterra, LLC

20950 NE Talus Place

97701 Bend, OR

(U.S.A.)

Pittogrammi di
pericolo



Avvertenza
Indicazioni di
pericolo
Consigli di
prudenza

Attenzione
H315: Provoca irritazione cutanea
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea
P261: Evitare di respirare il prodotto nebulizzato
P280: Indossare guanti ed indumenti protettivi
P302+352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua
P333+P313: IN CASO DI IRRITAZIONE O ERUZIONE DELLA PELLE: Consultare un medico
P362+364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa nazionale in materia di rifiuti pericolosi

**PER EVITARE RISCHI PER LA SALUTE UMANA E PER L'AMBIENTE,
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**

NORME PRECAUZIONALI

Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Indossare indumenti protettivi e guantidurante il caricamento, miscelazione ed applicazione del prodotto. Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato le il prodotto. Prima di accedere all'area trattata è opportuno attendere che la vegetazione sia completamente asciutta. In caso di rientro indossare tuta completa da lavoro e guanti protettivi. Prevenire la contaminazione di alimenti o mangimi o bevande. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (SP1).

FIRST AID INFORMATION

In caso di irritazione cutanea o ingestione, consultare un medico.

Contenuto netto: 450 – 900 mL per bottiglie da 0.5 e 1 L rispettivamente

Partita No.:

Data di produzione:

Data di scadenza: 2 anni dalla data di produzione

CARATTERISTICHE e APPLICAZIONE AUTORIZZATA

Subvert è un prodotto in sospensione di capsule per la confusione sessuale della tignoletta della vite (*Lobesia botrana*) in vite.

DIREZIONI PER L'USO

Si raccomanda di applicare Subvert prima o all'inizio del volo della generazione che si intende controllare.

Applicare il prodotto utilizzando apparecchiature standard. Utilizzare filtri da 50 mesh (o più grossolani) e ugelli in grado di disperdere grandi goccioline. Utilizzare solo pompe a pistoni, a membrana o centrifughe. Non utilizzare pompe a rulli o ingranaggi.

Utilizzare volumi d'acqua sufficienti ad assicurare una completa copertura della vegetazione evitando un eccessivo sgocciolamento. Il volume d' acqua utilizzata può variare da 10 a 1000 litri, a seconda dell'attrezzatura utilizzata per l'applicazione della fenologia della coltura.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso ed applicare il prodotto immediatamente dopo la preparazione.

La dose di applicazione varia da 65 a 135 ml di prodotto/ettaro per ogni applicazione (equivalenti a 12 e 25 g di sostanza attiva/ettaro). L'intervallo minimo tra le applicazioni è di 14 giorni in caso di utilizzo del dosaggio inferiore e di 28 giorni per il dosaggio maggiore. Non superare il quantitativo annuo di 945 mL/ha.

Si raccomanda di ripetere il trattamento in caso di pioggia dilavante.

Subvert è un prodotto di confusione sessuale che interferisce con la capacità dei maschi di *L. botrana* di localizzare le femmine ed accoppiarsi. Non produce nessun effetto diretto su uova, larve o femmine già fecondate. Nel caso in cui il prodotto sia applicato dopo l'inizio dei voli, potrebbe essere necessario l'uso complementare di insetticidi o altri metodi di controllo capaci di controllare le uova e le larve esistenti. L'immigrazione di femmine già fecondate da fonti adiacenti di infestazione non è influenzata dal prodotto e potrebbe ridurre il livello di controllo.

Si raccomanda l'uso di Subvert in sistemi di gestione integrata. L'uso di altri metodi di controllo potrebbe essere necessario e deve essere basato su un'appropriate attività di monitoraggio e di valutazione di eventuali danni in campo.

Tempo di carenza: 3 giorni.

Tempo di rientro: non richiesto.

Non si sono osservati effetti di fitotossicità.

AVVERTENZE

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Conservare il prodotto nella confezione originale.

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE.**

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 19 novembre 2020

Subvert™ è un marchio Suterra® LLC, U.S.A