

# Aliette®

Aliette è il fungicida attivo sia su malattie fungine che batteriche. Agisce sulle reazioni di autodifesa delle piante oltre che direttamente sui patogeni.



## Aliette®

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE g/100 litri	MODALITÀ D'IMPIEGO	TEMPO di CARENZA gg
<b>Agrumi</b> (Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo)	Fitoftora Allupatura	200-300	Trattamenti fogliari in primavera e autunno. Pennellatura zone infette con 250 g/L.	<b>15</b>
<b>Vivai di agrumi</b>	Fitoftora	400	2 trattam. a distanza di 60 gg.	
<b>Coltura e vivai di Melo e Pero</b>	Ticchiolatura	150-200	Trattamenti preventivi in associazione a prodotti di copertura.	<b>28</b>
	Marciume radicale	250	Dalla sfioritura trattamenti fogliari con cadenza mensile.	
		50 g/L	Annaffiatura alla base delle piante colpite.	
	<i>Erwinia</i> (colpo di fuoco), Gemme nere ( <i>Pseudomonas syringae</i> ), Maculatura bruna	50-250	Trattamenti preventivi.	
<b>Cotogno-rosacee ornamentali</b>	<i>Erwinia</i> (colpo di fuoco)	250	Trattamenti preventivi.	
<b>Actinidia</b>	Marciume radicale	250	Trattamenti mensili da sfioritura.	<b>40</b>
		50 g/L	Irrigazioni localizzate.	
<b>Vite</b>	Peronospora	250	Trattamenti preventivi sempre in associazione con prodotti di copertura (ossicloruri e idrossidi di rame esclusi).	<b>28</b>
<b>Fragola</b>	Fitoftora	250	Immersione piantine in pre-trapianto. Trattamenti in vegetazione (1 autunnale - 2 primaverili).	<b>14</b>
<b>Lattughe e altre insalate*</b>	Peronospora	200-300	Dalle prime fasi vegetative ripetere ogni 10-14 giorni. Nelle fasi di maggiore sviluppo della coltura impiegare non meno di 2-3 kg/ha. Su lattughe romane effettuare saggi preliminari.	<b>14</b>
<b>Carciofo</b>		200		<b>21</b>
<b>Melone Cetriolo Anguria</b>	Peronospora	200-300	Alle prime bagnature infettanti, interventi preventivi ogni 8-10 giorni.	<b>3</b>
<b>Ornamentali in serra e pieno campo</b>	Marciume radicale	5-10 g/m <sup>2</sup>	Trattamenti preventivi.	-

\* Verificare sempre gli impieghi riportati in etichetta.

Con forte pressione di malattia si consiglia l'associazione con fungicidi di copertura. Il prodotto non è compatibile con ossicloruri e idrossidi rameici. Non miscelare ad oli, concimi fogliari, fitostimolanti e fitoregolatori. Con sbalzi termici alcune varietà di lattuga possono venire sensibilizzate dal prodotto.



12 x 1 kg



6 kg singolo



**Composizione:** Fosetil Al 80%

**Formulazione:** Microgranuli autodispersibili

**Classificazione:**  ATTENZIONE

**Registrazione:** n. 4710 del 24.02.1982

® = Marchio registrato