



INSETTICIDA AD AMPIO SPETTRO DI AZIONE

AMPLIGO è un insetticida ad ampio spettro di azione, dotato di rapido potere abbattente e lunga durata di azione sui parassiti. AMPLIGO è la soluzione completa e flessibile per il controllo di lepidotteri e diabrotica del mais.

INSETTICIDA



Disponibile anche presso i Consorzi Agrari con il marchio

 Kendo® Bi-Active

COMPOSIZIONE

Chlorantraniliprole 9,26% (100 g/l)
Lambda-cialotrina 4,63% (50 g/l)

FORMULAZIONE

miscela di sospensione di capsule
e sospensione concentrata

NUMERO DI REGISTRAZIONE

14936 del 27.6.11

INDICAZIONI DI PERICOLO

ATTENZIONE



DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COLTURE	PARASSITI	Dosi (l/ha)	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Pomodoro	Lepidotteri: <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera</i> spp. Tuta absoluta; Afidi: <i>Aphis fabae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>	0,2	Lepidotteri: applicare AMPLIGO durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. Effettuare al massimo 1 trattamento per anno.	3 gg
Cavolo broccolo	Lepidotteri: <i>Plutella xylostella</i> , <i>Pieris brassicae</i> , <i>Spodoptera</i> spp. Afidi: <i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Lipaphis erysimi</i>			
Mais	Lepidotteri: <i>Ostrinia nubilalis</i> , <i>Sesamia nonagrioides</i> , <i>Helicoverpa</i> spp., <i>Diabrotica virgifera</i> , <i>Popillia japonica</i>	0,3	<i>Diabrotica virgifera:</i> applicare durante la fase di ovideposizione. Effettuare al massimo 1 trattamento per anno.	14 gg
Mais dolce	Lepidotteri: <i>Ostrinia nubilalis</i> , <i>Sesamia nonagrioides</i> , <i>Helicoverpa</i> spp.			
Patata	<i>Phthorimae operculella</i> <i>Leptinotarsa decemlineata</i>	0,25	<i>Dorifora:</i> applicare alla comparsa dei primi adulti o al raggiungimento della soglia di intervento. Effettuare al massimo 1 trattamento per anno.	14 gg
	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	0,2		
Carciofo	Lepidotteri: <i>Spodoptera exigua</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Chrysodeixis chalcites</i> Afidi: <i>Brachycaudus cardui</i> , <i>Brachycaudus persicae</i> , <i>Macrosiphum</i> sp.	0,2		3 gg
Riso	Coleotteri: <i>Lissorhoptrus oryzophilus</i> Afidi	0,25	Applicare su risaia sgrondata entro la fase di inizio accestimento. Non superare il numero massimo di 1 trattamento per anno.	

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

Si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro di AMPLIGO indicate in tabella per ciascuna coltura, indipendentemente dai volumi di acqua impiegati per la distribuzione.

Non impiegare in serra.

CONFEZIONI



flaconi da **500 ml**
in cartoni da 20 pezzi

flaconi da **1 l**
in cartoni da 12 pezzi

