



CABRIO® TOP

FUNGICIDA POLIVALENTE AUTORIZZATO SU POMODORO E VITE



COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
5 g di F500® (Pyraclostrobin) e 55 g di Metiram



FORMULAZIONE

Granuli
Idrodispersibili (WG)



CLASSIFICAZIONE



ATTENZIONE



REG. MIN. SALUTE

N° 12528
del 02-02-2005



CONFEZIONE



1 Kg
flacone *



5 Kg
sacchetto



IMBALLO

Cartone
- da 10 flaconi
- da 2 sacchetti

Caratteristiche

È un fungicida ad ampio spettro d'azione per Pomodoro e Vite.

CABRIO® TOP nasce dalla combinazione di due sostanze attive che agiscono con modalità complementari su un ampio spettro di malattie. CABRIO® TOP in parte penetra rapidamente nei tessuti della pianta ed in parte aderisce tenacemente alle superfici. Inoltre, non essendo dotato di attività sistemica, non incorre in diluizioni a carico degli organi più importanti (es. grappoli). Di conseguenza, CABRIO® TOP offre una protezione continua e duratura delle parti trattate, limitando il rischio di dilavamento.

Modalità d'uso

Per sfruttare pienamente le caratteristiche di CABRIO® TOP se ne consiglia l'impiego nell'ambito di una strategia preventiva non superando i 2-3 trattamenti all'anno. Il dosaggio flessibile (1,5-2 kg/ha) consente al prodotto di adattarsi alle reali necessità della coltura ed alle condizioni meteo e, quindi, alla pressione del patogeno.

Avvertenze

CABRIO® TOP offre risultati costanti quando è inserito in un corretto programma di difesa. Se ne consiglia pertanto l'impiego nell'ambito di uno schema di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione (es. per la lotta alla Peronospora è ideale l'alternanza con FORUM®).

COLTURA	PATOGENI	DOSE (Kg/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N°MAX trattamenti annui	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
POMODORO***	Alternariosi, Cladosporiosi, Oidio, Peronospora, Septoria	1,5-2	Preventivamente nei periodi critici di sviluppo delle malattie ad intervalli di 7-10 gg	3	7
VITE	Peronospora Oidio Black rot Escoriosi	1.5 – 2**	Preventivamente nei periodi critici di sviluppo delle malattie ad intervalli di 8-12 gg	3	35

*** PIENO CAMPO E SERRA

** Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione è necessario usare la dose più alta ed accorciare l'intervallo tra i trattamenti.