



CANTUS®

FUNGICIDA POLIVALENTE PER DRUPACEE, MELO, PERO,
VITE E POST-RACCOLTA DEL KIWI

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto
contengono:
50 g
di *Boscalid*

FORMULAZIONE

Granuli
Idrodispersibili (WG)

CLASSIFICAZIONE



REG. MIN. SALUTE

N° 12862
del 12-07-2006

CONFEZIONE



1
Kg
flacone

IMBALLO

Cartone
- da 10 flaconi

Caratteristiche

È un fungicida attivo sull'*Alternaria* del Melo, sulla *Botrite* della Vite e del Kiwi, sulla *Maculatura bruna* del Pero, sulla *Monilia* delle Drupacee e sull'*Oidio* della Vite.

Modalità d'uso

Per la Vite i momenti chiave per il controllo della *Botrite* sono:

- Fine fioritura
- Pre-chiusura grappolo
- Invaiaura
- Pre-raccolta

Per sfruttare a pieno anche l'efficacia antioidica di **CANTUS®**, la fase più indicata per intervenire è la pre-chiusura grappolo. Il programma di difesa contro la *Botrite* va completato con prodotti a diverso meccanismo d'azione (es. *SCALA®*). Per *Drupacee*, *Melo* e *Pero* si consigliano applicazioni di tipo preventivo, intervenendo in relazione alla pressione della malattia e all'andamento delle precipitazioni, mentre per il *Kiwi* l'applicazione con **CANTUS®** va eseguita in post-raccolta.

Avvertenze

Su *Vite*, **CANTUS®** deve essere applicato preventivamente tenendo sempre presente che forte umidità (pioggia o nebbia) e ferite, soprattutto degli acini, provocate da grandine, insetti (*Tignola* e *Tignoletta*) o funghi (*Oidio*), favoriscono lo sviluppo della *Botrite*. Si consiglia di impiegare volumi d'acqua che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando il gocciolamento della vegetazione. Nel caso di trattamenti con volumi d'acqua inferiori a 1.000 l/ha su *Vite*, fare riferimento alle dosi ad ettaro indicate in tabella e da intendersi come minime.

Per *Drupacee*, *Melo* e *Pero* il prodotto è da inserire in una specifica strategia di difesa, rispettando le dosi ad ettaro, indipendentemente dai volumi d'acqua distribuiti.

COLTURA	PATOGENI	CONDIZIONI D'IMPIEGO	DOSE (g/h)	DOSE (kg/ha)	N°MAX trattamenti annui	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
ACTINIDIA (KIWI) Post-raccolta	Botrite	Bagni	75	-	1	60
ALBICOCCO CILIEGIO NETTARINA PESCO SUSINO	Moniliosi	Fogliare	40	0,4	3	3
MELO	Alternariosi	-	25	0,375	3	7
PERO	Maculatura bruna	Fogliare	27	0,4	3	7
VITE	Botrite, Oidio	Fogliare	100-120	1-1,2	1	28