


**ANTIOIDICO CON MECCANISMO DI AZIONE UNICO
E ORIGINALE PER VITE, MELO E DRUPACEE**

CIDELY è un innovativo antioidico per vite e melo in formulazione emulsione acquosa, a base della nuova sostanza attiva Cyflufenamid. CIDELY è dotato di un meccanismo d'azione diverso da quello di tutti gli altri antioidici presenti in commercio, con i quali non manifesta resistenza incrociata.

CIDELY agisce inibendo lo sviluppo del micelio, la formazione degli austori e la sporulazione dell'oidio e manifesta inoltre un'elevata attività preventiva unita ad una buona curatività.

CIDELY, una volta distribuito sulle piante, aderisce tenacemente alle cere degli organi vegetali, caratteristica che conferisce al prodotto un'elevata resistenza al dilavamento e una lunga persistenza di azione; presenta inoltre un'ottima ridistribuzione in fase di vapore.

CIDELY è caratterizzato da un'ottima selettività sugli artropodi utili e da un favorevole profilo tossicologico.

FUNGICIDA

Vite

Frutta
COMPOSIZIONE

 Cyflufenamid 5,1%
(51,3 g/l)

FORMULAZIONE

emulsione acquosa (EW)

INDICAZIONI DI PERICOLO
NUMERO DI REGISTRAZIONE

15449 del 22.6.12


DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COLTURE	PATOGENI	Dosi (ml/hl)	Dosi (l/ha)	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Vite	Oidio (<i>Uncinula necator</i>)	40-50	0,5	Intervenire in modalità preventiva ad intervalli di 10-14 giorni nel periodo tra inizio fioritura e ingrossamento acini. Per una difesa efficace si consiglia di far precedere il trattamento con CIDELY con prodotti della linea TOPAS o SCORE.	21 gg
Melo	Oidio (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	30-50	0,5	Intervenire in modalità preventiva ad intervalli di 7-10 giorni dalle prime foglie espanse alla pre-raccolta. Proseguire la difesa con TOPAS 200 EW.	14 gg
Pesco Nettarine Albicocco	Oidio (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	50-100	0,5	Intervenire in modalità preventiva ad intervalli di 7 giorni a partire da dopo la fioritura fino alla pre-raccolta.	14 gg

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

Assicurare una completa e omogenea bagnatura della vegetazione e in particolare dei grappoli.

Effettuare al massimo 2 interventi all'anno intervenendo prima della comparsa dei sintomi della malattia.

CONFEZIONI

 flaconi da **500 ml**
in cartoni da 20 pezzi

 flaconi da **1 l**
in cartoni da 12 pezzi
