



# EPIK® SL

Insetticida sistemico ad elevata attività specifica su cimice asiatica, *Popillia japonica*, cicaline, scafoideo, cocciniglie, mosche, afidi e altri fitofagi di un ampio numero di colture

COMPOSIZIONE **Acetamiprid 50 g/l**

FORMULAZIONE **Liquido solubile**

GRUPPO **IRAC 4A**

N. REGISTRAZIONE **16325 del 26-02-2015**

CONFEZIONE **1 L (x 10), 5 L (x 4)**

COLTURA	AVVERSITÀ	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
AGRUMI (Arancio, Mandarino compreso Clementine ed altri ibridi, Limone, Bergamotto, Cedro, Pompelmo, Tangerino, Limetta, Chinotto, Arancio amaro, Mapo, Tangelo)	Afidi, Aleurodidi ( <i>Aleurotrixus</i> sp., <i>Aleurocactus</i> sp.), Cimici ( <i>C. trivialis</i> , etc), Mosca ( <i>C. capitata</i> ), <i>Bactrocera dorsalis</i> , Minatrice serpentina, Cocciniglie ( <i>Planococcus</i> sp., <i>Aonidiella</i> sp.)	100 - 150 ml/hL (2 L/ha)	14 gg
	Cicaline ( <i>E. decedens</i> , etc)	100 ml/hL (1,5 L/ha)	
POMACEE (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo)	Afidi (compreso Afide lanigero, <i>E. lanigerum</i> ), Maggiolino ( <i>M. melolontha</i> ), Mosca ( <i>C. capitata</i> ), <i>Popillia japonica</i>	100 - 150 ml/hL (2 L/ha)	14 gg
	Psille (adulti), Tentredini, Minatori fogliari ( <i>Leucopetra</i> sp., <i>Lithocolletis</i> sp., <i>Phyllonorycter</i> sp.), Cicaline, Metcalfa, Antonomo, Miridi, Cimici (compresa <i>Halyomorpha halys</i> )	100 ml/hL (1,5 L/ha)	
PESCO, NETTARINE, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO, AMARENA, PRUGNOLO	Afidi, Mosche ( <i>C. capitata</i> , <i>R. cerasi</i> ), <i>Drosophila suzukii</i> , <i>Bactrocera dorsalis</i> , Tortrice ( <i>Cacoecia rosana</i> ), <i>Popillia japonica</i>	130 - 200 ml/hL (2 L/ha)	14 gg
	Minatori fogliari, Cicaline ( <i>Empoasca</i> sp., <i>Z. flammigera</i> , <i>C. viridis</i> ), Metcalfa, Miridi, Cimici (compresa <i>Halyomorpha halys</i> )	100 ml/hL (1,5 L/ha)	
VITE (da vino e da tavola)	Cocciniglie ( <i>Planococcus</i> sp., <i>Heliothrips</i> sp., <i>Partenolecanium</i> sp.), Mosca ( <i>C. capitata</i> ), <i>Drosophila suzukii</i> , Fillossera, Afidi, Tripidi estivi (escluso <i>F. occidentalis</i> su uva da tavola),	200 ml/hL (2 L/ha)	14 gg

## CARATTERISTICHE

EPIK SL è l'insetticida sistemico che si distingue per l'elevata efficacia specifica su parassiti particolarmente temuti o di recente insediamento su un ampio numero di colture. EPIK SL è autorizzato su Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) su pomacee, drupacee e altre colture. EPIK SL è inoltre registrato sulla coltura dell'olivo per il controllo della mosca (*Bactrocera oleae*) della sputacchina (*Philaenus spumarius*) della cecidomia (*Dasineura oleae*) e della tignola (*Prays oleae*). Per individuare il momento ideale degli interventi monitorare costantemente la presenza degli insetti con le soluzioni PHEROCON.

## TUTELA DELL'AMBIENTE

Rispettare una distanza dai corpi idrici superficiali di:  
30 m per pomacee e pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio, amarena e prugnolo  
20 m per agrumi, vite da vino e da tavola, fragole, lampone e more di rovo.  
Rispettare una fascia vegetata non trattata di:  
20 m per olivo, lattughe e simili, spinaci e simili e erbe fresche  
10 m per solanacee, cucurbitacee con buccia commestibile e non commestibile, cavoli ad infiorescenza, legumi freschi da granella, carciofo, patata, frumento, tabacco, floreali e ornamentali e vivai di piante madri di vite.

COLTURA	AVVERSITÀ	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
VITE (da vino e da tavola)	Aleurodidi ( <i>Aleurocactus</i> sp.), <b>Tignola e Tignoletta</b> , <i>Popillia japonica</i>	200 ml/hL (2 L/ha)	14 gg
	Cicadellidi ( <i>Empoasca</i> sp., <i>Z. rhamni</i> , <i>S. titanus</i> , <i>H. obsoletus</i> ), Minatori fogliari ( <i>Antispila</i> sp.; <i>Phyllocnistis</i> sp.; <i>Holocacysta</i> sp.), <b>Cimici</b> <i>Anomala vitis</i> , <i>Melolontha</i> sp. <b>Metcalfa</b>	150 ml/hL (1,5 L/ha)	
LAMPONE, MORE DI ROVO	<i>Drosophila suzukii</i> , Afidi, Cicaline ( <i>A. decedens</i> ), Antonomo ( <i>A. rubi</i> ), <b>Metcalfa e Cimici</b> , <i>Popillia japonica</i>	180 - 220 ml/hL (1,8 L/ha)	7 gg
OLIVO	<b>Mosca</b> ( <i>Bactrocera oleae</i> ), <b>Tignola</b> ( <i>Prays oleae</i> ), <b>Sputacchina</b> ( <i>Philaenus spumarius</i> ), <b>Cecidomia fogliare dell'Olivo</b> ( <i>Dasineura oleae</i> )	150 ml/hL (1,5 L/ha)	21 gg
FRAGOLA Pieno campo e serra	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, <i>Drosophila suzukii</i> , Antonomo	125 - 150 ml/hL (1,25 L/ha)	3 gg
SOLANACEE (Pomodoro, Melanzana, Peperone). Pieno campo e serra	Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Dorifora, Miridi, Minatori fogliari ( <i>Liriomyza</i> sp.), Cimici ( <i>N. viridula</i> , <i>P. prasina</i> , etc), Cicadellidi ( <i>Empoasca</i> sp., <i>H. obsoletus</i> ), <i>Popillia japonica</i> , <i>Bactrocera dorsalis</i>	200 - 300 ml/hL (2 L/ha)	7 gg (pieno campo) 3 gg (serra)
	Piralide	160 - 250 ml/hL (1,6 L/ha)	
CUCURBITACEE con buccia non commestibile (Melone, Cocomero, Zucca, etc.) Pieno campo e serra	Afidi, Aleurodidi, <i>Popillia japonica</i> , <i>Bactrocera dorsalis</i>	200 - 300 ml/hL (2 L/ha)	14 gg
CUCURBITACEE con buccia commestibile (Cetriolo, Zucchini, etc.) Pieno campo e serra	Afidi, Aleurodidi, <i>Popillia japonica</i>	200 - 300 ml/hL (2 L/ha)	7 gg (pieno campo) 3 gg (serra)
LATTUGHE Pieno campo e serra	<b>Afidi, Altica, Cicaline, Minatori fogliari, Tripidi, Miridi</b> , <i>Popillia japonica</i>	200 - 250 ml/hL (2 L/ha)	10 (pieno campo) 8 (serra)
<b>DOLCETTA, RUCOLA, PRODOTTI BABY LEAF</b> (compresse le brassicacee) Pieno campo e serra.	<b>Afidi, Altica, Cicaline, Minatori fogliari, Tripidi, Miridi</b> , <i>Popillia japonica</i>	200 - 250 ml/hL (2 L/ha)	10 (pieno campo) 5 (serra)

EPIK® SL

INSETTICIDI E NEMATOCIDI

COLTURA	AVVERSITÀ	INDICAZIONI DI IMPIEGO	INT. SIC. GIORNI
SPINACI E SIMILI Pieno campo	Afidi, Altica, Cicaline, Minatori fogliari, Tripidi, Miridi, <i>Popillia japonica</i>	200 - 250 ml/hL (2 L/ha)	10 gg
ERBE FRESCHE (cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, foglie di alloro, ecc) Pieno campo e serra	Afidi, Cicaline, Minatori fogliari, Miridi, <i>Popillia japonica</i>	200 - 300 ml/hL (2 L/ha)	10 (pieno campo) 5 (serra)
CARCIOFO	Afidi	150 - 250 ml/hL (1,5 L/ha)	7 gg
CAVOLI A INFIORESCENZA (Cavoli, Broccoli, Cavolfiori, etc)	Afidi, Altiche, Cimici	160 - 250 ml/hL (1,6 L/ha)	14 gg
LEGUMI FRESCHI (Fagioli, Fagiolini, Piselli) LEGUMI DA GRANELLA (Fagioli, Piselli, Fave, Cece e Cicerchia)	Afidi, Tripidi, Minatori fogliari	160 - 250 ml/hL (1,6 L/ha)	14 gg
PATATA	Afidi, Dorifora, Miridi	150 - 250 ml/hL (1,3 L/ha)	14 gg
FRUMENTO	Afidi, Cimici, <i>Oulema</i> sp.	1 L/ha	28 gg
ERBA MEDICA	Afidi, Fitodecta, <i>Apion</i> sp.	0,5 L/ha	14 gg
TABACCO	Afidi, Pulce ( <i>Epirix</i> sp.), <i>Popillia japonica</i>	200 - 300 ml/hL (2 L/ha)	14 gg
COTONE	Afidi	150 - 250 ml/hL (1,3 L/ha)	14 gg
FLOREALI ED ORNAMENTALI Pieno campo e serra	Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Cimici, Cicaline, Minatori fogliari, Maggiolino, Cicadellidi,	200 - 300 ml/hL (1,5 - 2 L/ha)	-
	<i>Popillia japonica</i>	200 ml/hL (2 L/ha)	
VIVAI DI PIANTE MADRI DI VITE	Afidi, Fillossera, Cicadellidi, Cocciniglie ( <i>Planococcus</i> sp., <i>Heliococcus</i> sp.), Minatori fogliari ( <i>Antispila</i> sp.; <i>Phyllocnistis</i> sp.; <i>Holocacysta</i> sp.)	200 - 300 ml/hL (1,5 - 2 L/ha)	-
	<i>Popillia japonica</i>	200 - 300 ml/hL (2 L/ha)	

EPIK® SL

## IMPIEGO SU COLTURE PORTASEME

destinate esclusivamente alla produzione di materiale riproduttivo (da seme)

EPIK® SL

COLTURA	AVVERSITÀ	INDICAZIONI DI IMPIEGO
SOLANACEE (Pomodoro, Melanzana, Peperone, etc.), CUCURBITACEE a buccia non commestibile (Melone, Cocomero, Zucca, etc.), CUCURBITACEE a buccia commestibile (Cetriolo, Zucchini, etc.), LATTUGHE E ALTRE INSALATE COMPRESSE LE BRASSICACEE, SPINACI E SIMILI, ERBE FRESCHE, CORIANDOLO, CAVOLI AD INFIORESCENZA, FAGIOLI, FAGIOLINI, FAVE, PISELLI, CECI, LENTICCHIE, LUPINI, CICERCHIE, CARCIOFO, ERBA MEDICA, FRUMENTO Pieno campo e serra	Afidi, Aleurodidi, Cimici, Tripidi, Altiche, Cicadellidi, Minatori fogliari, <i>Apion</i> , Fitodecta, Cavallette	200 - 300 ml/hL (1,5 - 2 L/ha)
	<i>Popillia japonica</i>	200 - 300 ml/hL (2 L/ha)