

# FOLPAN® 80 WDG

Fungicida antiperonosporico di copertura ad azione multi-sito, attivo sulle principali patologie fungine di vite, pomodoro, ornamentali e floreali. Ideale per la gestione preventiva delle resistenze.



1 kg

5 kg



**FORMULAZIONE:**  
Granuli idrodispersibili

**COMPOSIZIONE:**  
Folpet 80% (800 g/kg)

**FRAC:**  
(M4)

**N. REGISTRAZIONE:**  
8601 del 03-12-1994

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Vite da vino e da tavola	Escoriosi, Marciume Nero	2 kg/ha (200 g/hl)	Massimo 10 trattamenti/anno per uva da vino e 4 trattamenti/anno per uva da tavola. Intervallo tra le applicazioni di 7-10 giorni. Intervenire dalla ripresa vegetativa e quando si intravedono le prime foglie aperte	28 giorni per Vite da vino 56 giorni per Vite da tavola
	Peronospora, Botrite, Oidio, Marciumi secondari	1,25-1,5 kg/ha (125-150 g/hl)	Massimo 10 trattamenti/anno per uva da vino e 4 trattamenti/anno per uva da tavola. Intervallo tra le applicazioni di 7-10 giorni. Intervenire dalla pre-fioritura per la protezione dall'Oidio ed in pre-chiusura grappolo per la Botrite. Su Peronospora applicare anche in fase di allevamento e in vivai	
	Marciume bianco (in genere indotta da una grandinata)	1,6-1,8 kg/ha (160-180 g/hl)	Massimo 10 trattamenti/anno per uva da vino e 4 trattamenti/anno per uva da tavola. Intervenire tempestivamente entro 12-18 ore dalla grandinata. Intervallo tra le applicazioni di 7-10 giorni	
Pomodoro (in pieno campo e serra)	Peronospora, Alternaria, Cladosporiosi, Septoriosi, Botrite	1,5 kg/ha (150 g/hl)	Massimo 3 trattamenti/anno (serra) e 4 trattamenti/anno (pieno campo); intervallo tra i trattamenti 7-10 giorni	10 giorni
Floreali ed Ornamentali	Botrite, Marciumi radicali e basali e Peronospora	2-3 kg/ha (200-300 g/hl)	-	-



Avvertenza: **ATTENZIONE**  
Indicazioni di pericolo: H317 - H319 - H351 - H400 - H411 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.