



FUNGICIDA PER IL CONTROLLO DI MACULATURA, ALTERNARIA E MALATTIE DA CONSERVAZIONE DI MELO E PERO E DELLA BOTRITE DELLA VITE, FRAGOLA, POMODORO, PEPPERONE, CUCURBITACEE E DA BOTRITE E SCLEROTINIA PER ALCUNE COLTURE ORTICOLE

GEOXE è un fungicida in granuli idrodispersibili per il controllo della Maculatura bruna del pero (*Stemphylium* spp.), dell'alternaria del melo (*Alternaria* spp.) e per la prevenzione delle malattie della conservazione delle pomacee con trattamenti in pre-raccolta.

GEOXE è inoltre indicato per il controllo della Botrite su vite da tavola e da vino e su alcune colture orticole.

FUNGICIDA



Vite



Frutta



Orticole

COMPOSIZIONE

Fludioxonil 50%

FORMULAZIONE

granuli idrodispersibili

INDICAZIONI DI PERICOLO

ATTENZIONE

NUMERO DI REGISTRAZIONE

14699 del 28.10.11



DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COLTURE	PATOGENI	Dosi (kg/ha)	Dosi (g/hl)	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Melo Pero	Maculatura bruna e Alternariosi (<i>Stemphylium</i> spp. e <i>Alternaria</i> spp.) Malattie da conservazione (<i>Gloeosporium</i> spp., <i>Penicillium</i> spp., <i>Alternaria</i> spp., <i>Botrytis cinerea</i>)	0,45	30	Da frutto noce a pre-raccolta.	3 gg
Vite da vino Vite da tavola	Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>)	1	100	Un trattamento entro pre-chiusura grappolo e un trattamento all'invasatura o in pre-raccolta. Effettuare al massimo 2 interventi.	21 gg vite da vino 7 gg vite da tavola
Fragola (in pieno campo e serra)	Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,5	50	Massimo 2 trattamenti da inizio fioritura alla raccolta.	3 gg
Pomodoro, Peperone (in serra)	Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,5	50	Massimo 2 trattamenti da fioritura alla raccolta.	3 gg
Cucurbitacee (Cetriolo, Cetriolino, Zucchini) (in serra)	Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,5	50	Massimo 2 trattamenti da inizio fioritura a sviluppo completo dei frutti.	3 gg
Taccola, Pisello fresco senza baccello, Cece (in pieno campo)	Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>) Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.)	0,75	90	Massimo 2 trattamenti da pre fioritura a sviluppo completo del baccello.	14 gg
Fagiolino (in pieno campo)	Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>) Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.)	0,75	90	Massimo 2 trattamenti da pre fioritura a sviluppo completo del baccello.	14 gg
Lattughe e Insalate Spinacio, Erbe fresche (in pieno campo e serra)	Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>) Sclerotinia (<i>Sclerotinia</i> spp.)	0,5	50	Massimo 2 trattamenti da prima foglia vera alla raccolta.	7 gg
Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susine	Monilia (<i>Monilinia fructigena</i> , <i>Monilinia fructicola</i> , <i>Monilinia laxa</i>)	0,6	40	Massimo 2 trattamenti da invasiatura a pre-raccolta.	7 gg

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

Rispettare le dosi per ettaro di GEOXE indipendentemente dal volume di bagnatura utilizzato.

CONFEZIONI

flaconi da **500 g**
in cartoni da 12 pezzi

scatole da **1 kg**
in cartoni da 10 pezzi

