



### FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO SISTEMICO PER VITE E COLTURE ORTICOLE IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

RIDOMIL GOLD R LIQUIDO è un fungicida ad azione preventiva e curativa in formulazione liquida (sospensione concentrata), a basso contenuto rameico, per vite e numerose colture orticole.

A base dell'isomero attivo Metalaxil-M e di rame, RIDOMIL GOLD R Liquido ha una spiccata efficacia nei confronti della Peronospora. Il rapido assorbimento e la spiccata sistemica di Metalaxil-M garantiscono una protezione pronta e prolungata sia della vegetazione presente al momento del trattamento, sia di quella di nuova formazione. La componente rameica invece, presente sotto forma di Solfato Tribasico (=TBCS), consente una protezione esterna di contatto, garantendo un ottimo grado di copertura, resistenza al dilavamento e contemporanea attività nei confronti delle batteriosi.

### FUNGICIDA



Vite



Orticole

#### COMPOSIZIONE

Metalaxil-M g 1,85 (24 g/l)  
Rame metallo  
(sotto forma di Solfato Tribasico)  
g 15,4 (200 g/l)

#### FORMULAZIONE

sospensione concentrata

#### NUMERO DI REGISTRAZIONE

15348 del 6.7.12

#### INDICAZIONI DI PERICOLO

##### ATTENZIONE



### DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COLTURE	PATOGENI	Dosi (ml/hl)	Dosi (l/ha)	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Vite	Peronospora ( <i>Plasmopora viticola</i> )	400		Eseguire il primo trattamento al verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia, a partire dalla pre-fioritura successivamente intervenire ad intervalli cadenzati di 10-14 gg. Effettuare al massimo 4 applicazioni.	28 gg
Fragola (in pieno campo e serra)	Marciume bruno ( <i>Phytophthora cactorum</i> )		4	Intervenire 15-20 giorni dopo l'impianto e 30 giorni dopo il primo intervento. Possibile immersione delle piantine prima dell'impianto in una soluzione al 3 per mille.	40 gg
Pomodoro (in pieno campo e serra)	Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> ) Alternaria ( <i>Alternaria porri</i> sp. <i>solani</i> ) Batteriosi			Intervenire in presenza di condizioni sufficienti al determinare l'infezione, continuando ad intervalli di 10-14 giorni. Per gli ultimi interventi su pomodoro si consiglia un prodotto della famiglia COPRANTOL. Effettuare al massimo 4 applicazioni.	10 gg


### ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

Per una protezione ottimale dalla Peronospora durante tutto il ciclo colturale e per una corretta gestione delle resistenze, utilizzare RIDOMIL GOLD R Liquido in alternanza alle formulazioni di PERGADO o AMPEXIO, in modo da sfruttare le caratteristiche complementari e sinergiche dei due fungicidi.

Per un controllo contemporaneo dell'Oidio, miscelare con TOPAS 10 EC, TOPAS COMBI Liquido, SCORE 25 EC, CIDELY, DYNALI sulle colture dove questi prodotti sono registrati.

**Non utilizzare RIDOMIL GOLD R Liquido nei vivai di vite.**

RIDOMIL GOLD R Liquido non è compatibile con i formulati a reazione alcalina.



## DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COLTURE	PATOGENI	Dosi (ml/hl)	Dosi (l/ha)	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Patata <i>(solo in pieno campo)</i>	Peronospora <i>(Phytophthora infestans)</i> Alternaria <i>(Alternaria porri sp. solani)</i>		4	Effettuare 2-3 trattamenti alla cadenza di 10-14 giorni.	20 gg
Cocomero <i>(solo in pieno campo)</i> Melone <i>(in pieno campo e serra)</i> Cetriolo <i>(in pieno campo e serra)</i>	Peronospora <i>(Pseudoperonospora cubensis)</i> Alternaria <i>(Alternaria spp.)</i>				7 gg Cocomero 20 gg Melone 15 gg Cetriolo
Lattughe e insalate <i>(in pieno campo e serra)</i>	Peronospora <i>(Bremia lactucae)</i>				15 gg
Carciofo <i>(solo in pieno campo)</i>	Peronospora <i>(Bremia lactucae)</i> Alternariosi <i>(Alternaria spp.)</i>				20 gg

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni.

Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

## CONFEZIONI

flaconi da **1 l**  
in cartoni da 10 pezzi

taniche da **5 l**  
in cartoni da 4 pezzi

taniche da **10 l**

