



SCALA®

FUNGICIDA TRANSLAMINARE PER IL CONTROLLO DI BOTRITE E TICCHIOLATURA

Caratteristiche

SCALA® è un fungicida che controlla sia la Botrite di Orticole e Vite, sia la Ticchiolatura delle Pomacee. SCALA® impedisce alla Botrite di dare origine all'infezione e blocca negli stadi iniziali lo sviluppo del micelio fungino della Ticchiolatura. La sua attività translaminare gli permette di essere assorbito velocemente dalle foglie (Ticchiolatura) sfuggendo al dilavamento.

SCALA® non ritarda la maturazione dell'Uva, non esercita alcuna influenza sui processi fermentativi del mosto e non altera le caratteristiche organolettiche del vino. Il suo favorevole profilo ecotossicologico, unito al rispetto di insetti utili e fitoseidi, lo rende indicato all'impiego nei programmi di lotta integrata.

Modalità d'uso

Assicurare una distribuzione uniforme di SCALA®, nelle dosi e nei tempi indicati in tabella. Su Vite si consiglia di utilizzare SCALA® in alternanza ad altri prodotti antibotritici aventi diverso meccanismo d'azione, come CANTUS® (in pre-chiusura grappolo).

Avvertenze

SCALA® non è miscibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina, o contenenti *Alluminio* (fungicidi con *Fosetil-AI*) né con preparati contenenti *Calcio* o *Magnesio*. In serra e su colture protette, per evitare la possibile comparsa di fenomeni di fitotossicità, è necessario ventilare l'ambiente di coltivazione quando il prodotto viene impiegato con umidità relativa (U.R.) superiore all'80%.

COLTURA	PATOGENI	DOSE (ml/hl)	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N° MAX trattamenti annui	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
CAROTA*	Alternaria, Botrite	200	2	Dallo stadio di 4 foglie a 10-14 gg	2	14
CETRIOLINO** CETRIOLO** PEPERONE** ZUCCHINA**	Botrite	150-200	2	Da pre-fioritura ad intervalli di 10-14 gg	3	3
CICLAMINO***	Botrite	100-150	1,5-2,5	-	-	-
CIPOLLA*	Botrite	150-200	2	Dallo stadio di 3-6 foglie ad intervalli di 10 gg	3	14
FAGIOLINO**	Botrite	150-200	1,5-2	Da pre-fioritura ad intervalli di 10-14 gg	2	14
FRAGOLA	Botrite	150-200*	2-2,5*	Da pre-fioritura ad intervalli di 7-14* gg	3*	3*
	Botrite	150-200**	2**	Da pre-fioritura ad intervalli di 7-14** gg	2**	3**
LATTUGA*** SCAROLA***	Botrite	150-200	2	Iniziare fin dalle prime fasi vegetative per max 2 trattamenti all'anno a 10-14 gg	2	14
MELANZANA*** POMODORO***	Botrite	150-200	2	Da pre-fioritura ad intervalli di 10-14 gg	3	3
MELO PERO	Ticchiolatura	75-100	1,1-1,5	Da orecchiette di topo a fine fioritura ogni 7-10 gg	4	56
VITE Uva da tavola	Botrite, Marciumi secondari	200	2-2,5	Intervenire nelle fasi tipiche della difesa antibotritica	3	21
VITE Uva da vino	Botrite, Marciumi secondari	200	2-2,5	Intervenire nelle fasi tipiche della difesa antibotritica	1	21

* PIENO CAMPO ** SERRA *** PIENO CAMPO E SERRA

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
37,4 g di *Pyrimethanil* (pari a 400 g/l)

FORMULAZIONE

Sospensione concentrata (SC)

CLASSIFICAZIONE



REG. MIN. SALUTE

N° 8934 del 01-10-1996

CONFEZIONE



flacone



tanica

IMBALLO

Cartone
- da 10 flaconi
- da 4 taniche