

Shardif® 250 EC

Fungicida sistemico per il controllo della ticchiolatura e oidio su melo e pero, bolla e monilia su pesco, cercosporiosi su barbabietola da zucchero e altre malattie delle colture orticole e floricole.

Shardif® 250 EC è un fungicida sistemico a base di difenoconazolo, sostanza attiva appartenente ai triazoli, dotato di lunga persistenza e spiccata attività curativa.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Difenoconazolo puro 23,23% (250 g/l)	3 gruppo G1	Concentrato Emulsionabile (EC)	 PERICOLO Registrazione n°: 16354 del 12/05/2015



Flacone: 1 L
 Cartone: 12x1 L
 Pallet: 600 L

Visita
 la pagina
 prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Cercosporiosi (<i>Cercospora beticola</i>)	0,2-0,3	-	3 Ogni 15-20 gg	21
MELO, PERO	Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i>) Oidio (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	15 ml/hl	-	4	14
ASPARAGO	Puccinia asparagi, <i>Stemphylium vesicarium</i>	0,5	-	3-4 Ogni 10-14 gg	7
SEDANO	<i>Alternaria</i> spp., <i>Septoria</i> spp., Ruggini, Oidii, <i>Micosferella</i>	0,4-0,5	A seconda della pressione della malattia	3-4 Ogni 7-14 gg	21
CAROTA					7
CAVOLFIORE					14
PATATA					14
POMODORO	Cladosporiosi	0,5	-	3-4 Ogni 10 gg	7
	<i>Alternaria</i> spp., <i>Septoria</i> spp., Ruggini, Oidi, <i>Micosferella</i>	0,4-0,5	A seconda della pressione della malattia	3-4 Ogni 7-14 gg	
CETRIOLO	Oidi, Alternariosi	0,5	-	3-4 Ogni 10-14 gg	
PESCO	Bolla	20-30 ml/hl	Da inizio emissione foglie	2-3	
	Monilia		Pre-raccolta	1-2	
ROSA, GAROFANO	Oidi, Ticchiolatura, Ruggini	100 ml/hl	Effettuare saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie superfici	2-3 Ogni 7-14 gg	-