



Stiker® Flow

Acaricida ovo-larvicida per la lotta contro gli acari.

Composizione: Exitiazox puro g 24 (= 258,7 g/l) Gruppo IRAC: 10A

Formulazione: Sospensione Concentrata (SC)

Classificazione CLP:



Registrazione: n° 16083 del 21/05/2014



Flacone: 250 ml

Cartone: 40x250 ml

Pallet: 500 L


CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ✓ Il prodotto possiede un'azione translaminare e agisce sulle uova e sulle larve nei vari stadi di sviluppo dei Ragnetti rossi (es. *Panonychus citri*, *Tetranychus urticae*) e di quelli gialli (es. *Eotetranychus carpini*)
- ✓ Esplica un'azione sterilizzante sulle femmine bloccando lo sviluppo della progenie.

VANTAGGI:

1. Lunga persistenza d'azione.
2. Selettivo nei confronti degli insetti utili.

© Marchio registrato.



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell'etichetta ministeriale.

EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	FITOFAGO	DOSE (ml/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	PHI (gg)
AGRUMI (Pompelmo, Tangelo, Pomelo, Ugli, Arancio, Bergamotto, Arancio Amaro, Chinotto, Limone, Limetta, Mandarino, Clementina, Tangerino, Mineola)	<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus citri</i> , <i>Eotetranychus carpini</i>	4-6 (max 40-150 ml/ha)	Inizio dell'infestazione	14
VITE DA VINO VITE DA TAVOLA		20-30 (max 100-300 ml/ha)	Inizio dell'infestazione	21
POMACEE (Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo)		20-30 (max 160-300 ml/ha)	Inizio dell'infestazione	28
FLOREALI ED ORNAMENTALI (campo e serra)		20 (max 100-200 ml/ha)	Inizio dell'infestazione	-

Sulle colture in etichetta è ammesso un solo trattamento.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- ✓ Uso consentito in pieno campo e serra.
- ✓ Il prodotto non è miscibile con miscele alcaline come Polisolfuri e Calce.

