





Erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce, selettivo per colza, cavoli e aglio.

FORMULAZIONE: COMPOSIZIONE: HRAC: N. REGISTRAZIONE: Sospensione concentrata Metazaclor 44,3% (500 g/l) B 11526 del 06-12-2002

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Aglio	1,5 - 2 I/ha	Subito dopo la messa a dimora dei bulbilli o in post-emergenza quando la coltura ha sviluppato 2-4 foglie	
Colza	2 l/ha	In pre-emergenza, subito dopo la semina ed al più tardi entro 3 giorni. In post-emergenza precoce, quando la coltura ha sviluppato le prime 2 foglie vere e con le infestanti ancora allo stadio di plantula	-
Cavoli a infiorenscenza, cavoli a testa, cavoli a foglia	1,5 - 2 I/ha	Subito dopo la messa a dimora della coltura e prima della crisi di trapianto. In caso di abbondanti irrigazioni, impiegare il dosaggio più basso	

Efficacia d'uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI	
MONOCOTILEDONI ANNUALI	
Apera spica-venti (Capellini dei campi)	
Alopecurus spp. (Coda di topo)	
Poa spp. (Fienarola)	
Echinochloa spp. (Giavone)	
Lolium spp. (Loglio)	
Setaria spp. (Pabbio)	
Digitaria sanguinalis (Sanguinella comune)	
DICOTILEDONI ANNUALI	
Amaranthus retroflexus (Amaranto comune)	
Capsella bursa-pastoris (Borsa pastore)	
Matricaria spp. (Camomilla)	
Anthemis spp. (Camomilla inodore)	
Stellaria spp. (Centocchio)	
Lamium spp. (Falsa ortica)	
Chenopodium spp. (Farinello)	
Sonchus spp. (Grespino)	
Mercurialis annua (Mercorella comune)	
Solanum spp. (Erba morella)	
Myosotis spp. (Nontiscordardime)	
Urtica urens (Ortica minore)	
Papaver spp. (Papavero)	
Polygonum persicaria (Persicaria)	
Ranunculus spp. (Ranuncolo)	
Veronica spp. (Veronica)	

