

Teldor® Plus

Teldor Plus è il fungicida per la difesa da botrite, monilia e sclerotinia.

La formulazione liquida offre un'ottima efficacia preventiva e una lunga durata d'azione.



TELDOR® plus

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE litri/ha	MODALITÀ D'IMPIEGO	TEMPO di CARENZA gg
Vite	Botrite	1-1,5	Impiegare preferibilmente nella fase di pre-chiusura grappolo.	7
Pesco Albicocco Susino Ciliegio (applicazioni fogliari)	Botrite Monilia		In fioritura e nelle 2 settimane prima della raccolta.	3
Fragola Pomodoro Melanzana Cetriolo Zucchino Peperone (in serra)	Botrite		Da inizio fioritura a pre-raccolta.	
Lattughe e insalate** (in pieno campo e in serra) Erbe fresche e fiori commestibili (in pieno campo e in serra) Fagiolino (in serra e pieno campo)	Botrite Sclerotinia	1,5	Da sviluppo foglie a pre-raccolta. Da bottoni fiorali visibili a fine sviluppo baccelli.	
Cipolla (in pieno campo)	Botrite Sclerotinia	1,2	Da fine sviluppo foglie a raccolta.	
Actinidia (trattamenti di post-raccolta)	Botrite	0,12 L/hl	Trattamenti post-raccolta per irrorazione o per immersione.	60*
Pesco Albicocco Susino Ciliegio (trattamenti di post-raccolta)	Botrite Monilia	0,1 L/hl	Trattamento post-raccolta per irrorazione o per immersione (ciliegio) in alternativa ai trattamenti fogliari.	1*

* Intervallo di sicurezza tra il trattamento di post-raccolta e la commercializzazione della produzione

**Verificare sempre gli impieghi riportati in etichetta



12 x 1 L



4 x 5 L



Composizione: Fenexamid 42,8% (= 500 g/L)

Formulazione: Sospensione concentrata

Classificazione:



Registrazione: n. 13084 del 10.02.2010

© = Marchio registrato