



## VIVANDO®

FUNGICIDA ANTOIODICO IDEALE PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE ORNAMENTALI, ORTICOLE E DEL VIGNETO E PER IL CONTROLLO DEL MAL DELLA TELA DEI FUNGHI COLTIVATI

### Caratteristiche

VIVANDO®, formulato come sospensione concentrata, è lo specialista nella difesa contro l'Oidio delle colture **Orticole** e della **Vite**. La sostanza attiva **Metrafenone**, appartenente al gruppo chimico dei **Benzofenoni**, possiede un meccanismo d'azione nuovo, diverso da quello dei fungicidi antioidici già in commercio.

VIVANDO® penetra attraverso la cuticola fogliare e si accumula nei tessuti sottostanti la zona di applicazione. Una piccola quantità viene assorbita e traslocata con la linfa in direzione acropeta verso i margini fogliari. È stata dimostrata anche un'attività in fase di vapore che il basso tasso di volatilizzazione contribuisce a mantenere duratura nel tempo. L'insieme di queste caratteristiche di ridistribuzione contribuisce ad una più uniforme protezione fungicida della vegetazione trattata. VIVANDO® possiede, inoltre, un'ottima resistenza al dilavamento.

### Modalità d'uso

Su colture **Orticole** e su **Vite**: utilizzare VIVANDO® in maniera preventiva nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo d'azione. Per sfruttare appieno le potenzialità del prodotto, si consiglia l'uso ad inizio dei trattamenti e nella fase di maggiore sensibilità all'Oidio. VIVANDO® si integra perfettamente in una strategia di difesa che preveda l'uso di SERCADIS® e/o CANTUS® per la **Vite** e COLLIS® e/o DAGONIS® per le colture **Orticole**. Con alte pressioni della malattia o con rapida crescita della vegetazione si raccomandano le dosi più alte e gli intervalli più brevi.

### Avvertenze

Il numero massimo di interventi per anno su colture **Orticole** è pari a 2 e su **Vite** è pari a 3. I trattamenti vanno sospesi 28 giorni prima della raccolta su **Vite** e 3 giorni prima della raccolta per le colture **Orticole**. VIVANDO®, applicato da solo, non ha mai causato danni ai diversi vitigni e colture **Orticole** registrate sin qui saggiati.

COLTURA	PATOGENI	DOSE (ml/hl)	DOSE (ml/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	INTERVALLO DI TRATTAMENTO (gg)	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
CETRIOLO*** ZUCCHINO***	Oidio	20	200	Periodi critici all'infezione	7-10	3
COCOMERO*** MELONE****	Oidio	20	200	Periodi critici all'infezione	7-10	3
FLOREALI* ORNAMENTALI*	Oidio	25-75	250-750	Ad inizio dei trattamenti e nelle fasi sensibili	7-12	-
FUNGHI COLTIVATI*	Mal della tela	-	10000 (1 ml/m <sup>2</sup> )	Prima dell'inizio della prima fruttificazione, entro 2-4 gg dopo la copertura del composto	-	10
MELANZANA* PEPERONE*	Oidio	30	300	Periodi critici all'infezione	7-10	3
POMODORO***	Oidio	30	300	Periodi critici all'infezione	7-10	3
VITE	Oidio	20-25	200-250	Periodi favorevoli all'infezione	8-12	28

\* SERRA \*\*\* PIENO CAMPO E SERRA



### COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono: 42,37 g di **Metrafenone** (pari a 500 g/l)



### FORMULAZIONE

Sospensione concentrata (SC)



### CLASSIFICAZIONE



### REG. MIN. SALUTE

N° 13698 del 30-01-2007



### CONFEZIONE



flaconcino



flacone



### IMBALLO

Cartone  
- da 24 flaconcini  
- da 10 flaconi