



COLLIS®

FUNGICIDA ANTIIDIDICO PER CUCURBITACEE E VITE

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
18,2 g di *Boscalid* (pari a 200 g/l) e
9,1 g di *Kresoxim-metile* (pari a 100 g/l)

FORMULAZIONE

Sospensione concentrata (SC)

CLASSIFICAZIONE



ATTENZIONE

REG. MIN. SALUTE

N° 12866
del 28-09-2006

CONFEZIONE



1 Lt
flacone

IMBALLO

Cartone
- da 10 flaconi

Caratteristiche

È il vero specialista dell'Oidio, grazie ai due principi attivi che lo compongono.

Modalità d'uso

Si consiglia di impiegare **COLLIS®** nel periodo critico per l'Oidio, nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione con sostanze attive a diverso meccanismo d'azione. Con alte pressioni della malattia è necessario usare la dose più alta e l'intervallo tra i trattamenti più breve. **COLLIS®** offre le migliori prestazioni sia in apertura dei trattamenti, sia quando la pressione di malattia comincia a ritenersi pericolosa. È un prodotto da utilizzare preventivamente, che possiede un'ottima attività stoppante.

Avvertenze

Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Con volumi d'acqua inferiori a 1.000 l/ha (es. basso volume), fare riferimento alle dosi ad ettaro indicate in tabella e da intendersi come minime.

COLTURA	PATOGENI	DOSE (ml/hl)	DOSE (ml/ha)	INTERVALLO DI TRATTAMENTO (gg)	N°MAX trattamenti annuali	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
CETRIOLO***	Oidio	40-50	400-500	7-10	3	3
COCOMERO*** MELONE*** ZUCCA***	Oidio	40-50	400-500	7-10	3	3
VITE	Oidio	30-40	300-400	10-14	3	35
ZUCCHINO***	Oidio	40-50	400-500	7-10	3	3

*** PIENO CAMPO E SERRA