

# INSECTOIL KEY

## Insectoil Key

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INSECTOIL KEY es un insecticida y acaricida con una alta concentración de aceite parafina que muestra eficacia para el control de cochinillas.



**Nº DE REGISTRO:** ES-00291  
**COMPOSICIÓN:** Aceite de parafina 79% p/v  
**FORMULACIÓN:** Emulsion Concentrada (EC)  
**PRESENTACIÓN:** 1L, 5L, 25L

### MODO DE USO Y APLICACIONES AUTORIZADAS

Aplicar mediante pulverización foliar cubriendo todas las partes del cultivo.

Área de aplicación	Finalidad	Posología del preparado			Forma y época de aplicación (Condiciones fitoterapéuticos específicos)
		Dosis (L/ha)	Nº de aplic.	Volumen de caldo (L/ha)	
Cítricos	Ácaros	10-30	1	1000-2000	Incluye naranja, mandarina, limón, lima y pomelo contra los ácaros Panonychus citri, Eutetranychus banksi y Tetranychus urticae. Aplicar antes de que el fruto empiece a colorear (antes de BBCH 81)
	Cochinillas				Incluye naranja, mandarina, limón, lima y pomelo contra las cochinillas: Aonidiella aurantii, Aspidiotus nerii, Lepidosaphes spp. Aplicar antes de que el fruto empiece a colorear (antes de BBCH 81).
Frutales de hueso	Cochinillas	3.75-15	1	500-1000	Incluye melocotón, nectarina, albaricoque, ciruela y cereza contra las cochinillas: Quadraspidiotus perniciosus y Pseudaulacaspis pentagona. Aplicar antes de la apertura de la yema (antes de BBCH 53).
Frutales de pepita	Cochinillas	3.75-15	1	500-1000	Incluye manzana, pera, membrillo, níspero y níspero de Japón contra las cochinillas: Quadraspidiotus perniciosus. Aplicar antes de que estén las primeras flores abiertas (antes de BBCH 60).

### USOS MENORES:

Aguacate, Papaya, Guayabo	Ácaros, Cochinillas	10-30	1	1000-2000	(Uso menor): Aplicar en pulverización normal, antes de que el fruto empiece a colorear (antes de BBCH 81). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Almendro, Avellano, Mango, Nogal, Piña tropical, Pistacho, Platanera	Cochinillas	10-30	1	1000-2000	(Uso menor): Aplicar en pulverización normal, antes de que el fruto empiece a colorear (antes de BBCH 81). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Caqui, Kiwi	Cochinillas	3.75-15	1	5000-1000	(Uso menor): Aplicar en pulverización normal, antes de la apertura de la yema (antes de BBCH 53). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).

**Nº de aplic.:** Número de aplicaciones.



**INDUSTRIAL QUÍMICA KEY, S.A.**  
Av. Cervera, 17 25300 Tárrega (Lleida)  
Telf: 973 31 01 02 Fax: 973 31 14 16  
[key@key.es](mailto:key@key.es) [www.key.es](http://www.key.es)

Mantener la agitación continua durante la aplicación. El uso de envases de 200L queda restringida al uso en condiciones de trasvase cerrado mediante la utilización de un sistema automático de bombeo.

**PLAZO DE SEGURIDAD**

Entre el último tratamiento y la recolección de los frutos no procede establecer un plazo de seguridad.



**INDUSTRIAL QUÍMICA KEY, S.A.**  
Av. Cervera, 17 25300 Tárrega (Lleida)  
Telf: 973 31 01 02 Fax: 973 31 14 16  
[key@key.es](mailto:key@key.es) [www.key.es](http://www.key.es)