



Inquadra il QRcode e scarica l'etichetta aggiornata

FUNGICIDA

Colture	Principali avversità controllate	Dosi	N° max tratt. annui	Int. di sicurezza
Barbabietola da zucchero	Cercosporiosi (<i>Cercospora beticola</i>)	0.2-0.3 L/ha	3	21 giorni
Melo, pero	Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i>), oidio (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	0.225 L/ha (dose max 0,3)	4	14 giorni
Asparago (in pieno campo)	<i>Puccinia asparagi</i> , <i>Stemphylium spp.</i>	0,5 L/ha	3	-
Carota, cavolfiore (in pieno campo)	<i>Alternaria spp.</i> , <i>Mycosphaerella spp.</i> , <i>Oidium spp.</i> , <i>Septoria spp.</i> , <i>Uromyces spp.</i>	0.4-0.5 L/ha	3	14 giorni
Sedano (in pieno campo e serra)	<i>Alternaria spp.</i> , <i>Mycosphaerella spp.</i> , <i>Oidium spp.</i> , <i>Septoria spp.</i> , <i>Uromyces spp.</i>	0.4-0.5 L/ha	per pieno campo, 2 per serra	14 giorni
Patata	<i>Alternaria spp.</i> , <i>Mycosphaerella spp.</i> , <i>Oidium spp.</i> , <i>Septoria spp.</i> , <i>Uromyces spp.</i>	0.4-0.5 L/ha	3	3 giorni
Pomodoro, melanzana (pieno campo e serra)	<i>Cladosporium spp.</i> , <i>Alternaria spp.</i> , <i>Leveillula taurica</i> , <i>Mycosphaerella spp.</i> , <i>Septoria spp.</i> , <i>Uromyces spp.</i>	0.4-0.5 L/ha	3	7 giorni (3 in serra)
Cetriolo (pieno campo e serra)	Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>), alternariosi (<i>Alternaria spp.</i>)	0,5 L/ha	3	3 giorni
Finocchio (pieno campo)	<i>Ramularia (Ramularia spp.)</i>	0,5 L/ha	3	3 giorni

CARATTERISTICHE:

Formulato a base di difenoconazolo, fungicida appartenente alla classe degli inibitori della sintesi dell'ergosterolo.

Unisce capacità di movimento sistemico e traslaminare ad un'efficacia preventiva e curativa su un ampio numero di malattie.

VANTAGGI:

- Ampio spettro d'azione ed etichetta
- Elevata qualità formulativa
- Pratica confezione da 0,5 L

© Titolare della registrazione SYNGENTA

Registrazione Ministero della Salute n. 15292 del 29.12.2011



COMPOSIZIONE:

Difenoconazolo puro g 23,6 (250 g/L)

Coformulanti q.b. a g 100 contiene solvente nafta, polietilene glicole monoletico etere, dodecilbenzene solfonato di calcio, isobutanolo

FORMULAZIONE:

Concentrato emulsionabile

CONFEZIONE:

Bottiglia HDPE 0,5 L

CONTENUTO PALETTA:

119 x 10 x 0.5

CLASSIFICAZIONE:



PERICOLO

GRUPPO FRAC

3

FUNGICIDI

NOVITÀ

Vertiaro[®]

FUNGICIDA

Colture	Principali avversità controllate	Dosi	N° max tratt. annui	Int. di sicurezza
Vite	Black-rot (<i>Guignardia bidwellii</i>), oidio (<i>Erysiphe necator</i>)	0,2 L/ha	4	21 giorni
Pesco	Bolla (<i>Taphrina deformans</i>), monilia (<i>Monilinia fructicola</i>)	0.3-0.45 L/ha	2	7 giorni
Olivo	Occhio di Pavone (<i>Cycloconium spp.</i>)	0,5 L/ha	2	30 giorni
Broccoli (pieno campo)	<i>Alternaria spp.</i> , <i>Mycosphaerella spp.</i> , <i>Oidium spp.</i> , <i>Septoria spp.</i> , <i>Uromyces spp.</i>	0,5 L/ha	3	14 giorni

© Titolare della registrazione SYNGENTA

Registrazione Ministero della Salute n. 15292 del 29.12.2011