

MERPAN 80 WDG

Fungicida in granuli idrodispersibili per la protezione di melo, pero, cotogno, nashi, pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio, frutta a guscio

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo M4 (FRAC)

MERPAN 80 WDG

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 8102 del 09.11.1992

Composizione

Captano puro 80 g
coformulanti q.b. a 100 g
contiene disodium maleato

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H351 - Sospettato di provocare il cancro. H361f - Sospettato di nuocere alla fertilità.

H372 - Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P260 - Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P314 - In caso di malessere, consultare un medico.

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente



PERICOLO

ADAMA Italia S.r.l.

Via Zanica, 19 - 24050 Grassobbio (BG)

Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:

ADAMA Makhteshim Ltd. - Beer-Sheva - ISRAELE
ADAMA Makhteshim Ltd. - Neot Hovav, Beer-Sheva (Israele)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
CHEMARK Zrt. - 8182 Peremarton - Ungheria
Kollant S.r.l. - Maniago (PN)

Stabilimento di confezionamento:

BAYER ITALIA S.p.A. - Filago (BG)
KOLLANT S.r.l. - Maniago (PN)
CHEMARK Zrt. - 8182 Peremarton - Ungheria

Distribuito da:

BAYER S.p.A. - Milano
Contenuto: 0,1-1-5-10-20 kg Partita n. vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le acque sotterranee non applicare sui suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all' 80 %. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Non trattare nella fase di fioritura della coltura e prima del trattamento sfalcare le piante infestanti in fiore presenti nei filari delle colture;

L'uso su fruttiferi è consentito solo mediante attrezzature che garantiscano un incremento della precisione e dell'accuratezza dell'applicazione e la minima dispersione al di fuori della vegetazione fogliare bersaglio e attraverso tecniche e modalità di trattamento a più basso impatto ambientale rispetto a quelle convenzionali (ad esempio riduzione dei volumi di irrorazione in funzione della parete o del volume da trattare, ecc.) affinché, pur mantenendo il tasso di applicazione sulle superfici bersaglio, venga garantita la dose efficace sulla superficie o volume fogliare e si riduca di almeno il 61% la quantità di prodotto distribuita al di fuori della stessa vegetazione (quindi applicata per ettaro). Inoltre dette attrezzature e tecniche di applicazione dovranno assicurare una riduzione di almeno il 20 % della perdita di prodotto fitosanitario al suolo rispetto alle attrezzature e tecniche di applicazione convenzionali.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali:

- per pomacee e albicocco di 30 m (di cui 20 m vegetati);
- per pesco e nettarino e frutta a guscio di 30 m (di cui 20 m vegetati);
- per ciliegio: 30 m;
- per susino di 30 m (di cui 20 m vegetati);

Durante le fasi di manipolazione/miscelazione/carico del prodotto indossare guanti, indumenti protettivi e occhiali protettivi. Durante le fasi di applicazione del prodotto indossare guanti e tuta protettiva.

Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore dall'ultimo trattamento. Indossare guanti protettivi al rientro nell'area trattata.

Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritante gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); Interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia: sintomatica.

AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

DOSI, MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

Melo, Cotogno, Pero, Nashi: 150-160 g/hl (massimo **2 kg/ha**) in 800-1500 l/ha di acqua, per la protezione da ticchiolatura (*Venturia* spp.), *Gloeosporium*, maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*)

Non eseguire più di 10 trattamenti all'anno. La quantità di prodotto fitosanitario complessivamente utilizzabile per ettaro non dovrà superare 15.1 kg.

Pesco, Nettare: per la protezione da mal della bolla (*Taphrina deformans*), corineo (*Coryneum beijerinckii*), cancro dei nodi o fusicocco (*Phomopsis amygdali*), moniliosi (*Monilia* spp.). Trattamenti da caduta foglie fino a rottura gemme: 300 g/hl (massimo **4,5 kg/ha**). Trattamenti da inizio e in vegetazione: 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**). Si consiglia l'impiego di volumi d'acqua di 800-1200 l/ha. Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno.

La quantità di prodotto fitosanitario complessivamente utilizzabile per ettaro non dovrà superare 10.2 kg.

Albicocco e Susino: 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**) in 800-1500 l/ha d'acqua per il controllo di corineo (*Wilsonomyces carpophilus*) e moniliosi (*Monilia* spp.). Non eseguire più di 4 trattamenti all'anno.

La quantità di prodotto fitosanitario complessivamente utilizzabile per ettaro non dovrà superare 6.8 kg.

Ciliegio: 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**) in 800-1500 l/ha d'acqua in pre e post fioritura, o pre raccolta, per la prevenzione da moniliosi (*Monilia* spp.) e corineo (*Wilsonomyces carpophilus*). Non eseguire più di 2 trattamenti all'anno.

La quantità di prodotto fitosanitario complessivamente utilizzabile per ettaro non dovrà superare 3.4 kg.

FRUTTA A GUSCIO:

impiegare a 150 g/hl (massimo **2,25 kg/ha**) in 800-1500 l/ha d'acqua tra gli stadi di caduta foglie e pre- fioritura per un numero massimo di 4 interventi l'anno distanziati da almeno 7 giorni per la protezione da:

Mandorlo: fusicocco (*Phomopsis amygdali*), bolla (*Taphrina deformans*), ticchiolatura delle drupacee (*Venturia carpophila*), corineo (*Wilsonomyces carpophilus*), macchie fogliari rosse del mandorlo (*Polystigma ochraceum*)

Pistacchio: septoriosi (*Septoria pistaciae*), cancri rameali (*Botryosphaeria dothidea*), alternaria (*Alternaria* sp.)

Noce: antracnosi (*Gnomonia juglandis*)

Castagno: fersa (*Mycosphaerella maculiformis*)

Nocciolo: alternaria (*Alternaria* sp.), antracnosi (*Colletotrichum* sp.)

La quantità di prodotto fitosanitario complessivamente utilizzabile per ettaro non dovrà superare 6.8 kg.

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è compatibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina (Poltiglia Bordoiese, Polisolfuri ecc...) e prodotti a base di Oli e Zolfi.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Si sconsiglia l'uso del prodotto su alcune cultivar di melo (Stark Delicioso, Stayman, Renetta del Canada, Winesap) e di pero (Butirra d'Anjou, Butirra Claireau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna). Precauzionalmente è consigliabile trattare a distanza di almeno 3 settimane dai trattamenti con Oli minerali e di almeno 7 giorni dai trattamenti con Zolfi.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI MELO, COTOGNO, PERO, NASHI, PESCO, NETTARINE, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO, PER FRUTTA A GUSCIO SOSPENDERE I TRATTAMENTI AL TERMINE DELLA FIORITURA

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è

responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

