

# LEOPARD® 5 EC

Erbicida residuale di pre e post-emergenza precoce, selettivo per orticole, frutticole, vite ed estensive.



<b>FORMULAZIONE:</b> Concentrato emulsionabile	<b>COMPOSIZIONE:</b> Quisalofop-p-etile 5,4% (50 g/l)	<b>HRAC:</b> A	<b>N. REGISTRAZIONE:</b> 11243 del 15-03-2002
---	--	-------------------	--

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Cavoli a testa, Cavolfiore, Broccolo	1 - 3 l/ha	Applicare da superamento della crisi di trapianto fino a tempo di carenza. Massimo 1 trattamento/anno	30 giorni
Pomodoro e Melanzana	1 - 3 l/ha	Applicare da superamento della crisi di trapianto fino ad allegagione. Massimo 1 trattamento/anno	30 giorni
Colza, Patata, Erba medica, Trifoglio e Veccia	1 - 3 l/ha	Applicare entro la chiusura della fila. Massimo 1 trattamento/anno	100 giorni per Colza; 30 giorni per Patata
Tabacco	1 - 3 l/ha	Applicare fino al termine dell'allungamento degli internodi. Massimo 1 trattamento/anno	40 giorni
Vite da vino e da tavola, Melo, Pero, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone, Pesco e Nettarino	1 - 3 l/ha	Applicare prima che i frutti inizino ad assumere la colorazione specifica. Massimo 1 trattamento/anno	45 giorni per Vite; 30 giorni per Melo, Pero, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone, Pesco e Nettarino
Agrumi, Albicocco, Susino, Ciliegio e Frutta a guscio	1 - 3 l/ha	Tattamento in assenza di frutti. Massimo 1 trattamento/anno	-
Ornamentali, Vivai e Forestali	1 - 3 l/ha	Tattamento di post-emergenza delle malerbe solo mediante l'impiego di attrezzature schermate. Massimo 1 trattamento/anno	-
Lino e Cotone	1 - 3 l/ha	Tattamento di post-emergenza prima che le parti eduli della coltura si siano formate. Massimo 1 trattamento/anno	60 giorni per Cotone
Soia, Girasole, Barbabietola da zucchero, Barbabietola rossa e da foraggio	1 - 2,5 l/ha	Applicare entro la chiusura della fila. Massimo 1 trattamento/anno	60 giorni
Cipolla, Aglio, Scalogno	1 - 2,5 l/ha	Applicare fino al raggiungimento del 30% del diametro finale del bulbo. Massimo 1 trattamento/anno	30 giorni
Carota, Rapa e Ravanello	1 - 2,5 l/ha	Applicare fino al raggiungimento del 30% del diametro finale del fittone. Massimo 1 trattamento/anno	30 giorni
Cece, Lenticchia, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Favino e Pisello	1 - 2,5 l/ha	Applicare fino al termine dell'allungamento degli internodi o entro la chiusura della fila. Massimo 1 trattamento/anno	30 giorni per Cece, Lenticchia, Fagiolo e Pisello (consumo secco); 42 giorni per Fagiolo e Pisello (consumo fresco), Fagiolino, Favino e Fava
Cardo (uso non alimentare)	1 - 2 l/ha	Applicare entro la chiusura della fila. Massimo 1 trattamento/anno	-

## Efficacia d'uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI		
GRAMINACEE ANNUALI		GRAMINACEE POLIENNALI
<i>Alopecurus</i> spp. (Coda di topo)	<i>Lolium</i> spp. (Loietto)	<i>Agropyron repens</i> (Agropiro comune)
<i>Avena</i> spp. (Avena)	<i>Phalaris</i> spp. (Scagliola)	<i>Cynodon dactylon</i> (Gramigna comune)
<i>Digitaria</i> spp. (Sanguinella)	<i>Poa annua</i> (Fienarola)	<i>Sorghum halepense</i> (Sorghetta da seme)
<i>Echinochloa</i> spp. (Giovane)	<i>Setaria</i> spp. (Pabbio)	



Avvertenza: **PERICOLO**  
Indicazioni di pericolo: H304 - H315 - H319 - H336 - H410 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.