



DIPRIL®

ERBICIDA

Dipril è un erbicida selettivo in sospensione concentrata per il controllo delle infestanti dicotiledoni e graminacee di agrumi, vite, pomacee, drupacee, nocciolo e girasole.

Il prodotto agisce per contatto venendo assorbito localmente da foglie, germinelli e (in parte minore) dalle radici; inibendo l'enzima protoporfirinogeno-ossidasi (PPO), determina la distruzione del plasmalemma e conseguente morte delle cellule vegetali.

ALBAUGH: LA TUA ALTERNATIVA

- Elevata efficacia su numerose infestanti
- Ampio periodo d'impiego
- Ideale per miscele con Boom Efekt / Satellite / Hopper 480

AVVERTENZE AGRONOMICHE

In tutte le colture il prodotto deve essere impiegato solo con applicazioni in bande lungo la fila o sottochioma lungo i filari nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e la prima decade di maggio. L'area delle bande trattate non deve superare il 30% della superficie totale.

Nei vigneti, frutteti e agrumeti, il prodotto va impiegato a partire dal secondo anno di impianto e distribuito durante il periodo di dormienza (fino a 20 giorni prima dell'inizio del germogliamento).

Su girasole, eventuali piogge violente nella fase di emergenza potrebbero produrre temporanei sintomi fitotossici sulle prime foglie che scompaiono entro breve tempo. Non trattare in giornate con presenza di vento onde evitare effetto deriva su colture sensibili.

COMPOSIZIONE

Oxyfluorfen 22% (240 g/l)

FORMULAZIONE

Concentrato solubile

CONFEZIONI

1 L / 5 L

REGISTRAZIONE

n. 17344 del 22/01/2019

INDICAZIONI DI PERICOLO

PERICOLO



Scansionare il codice QR per le informazioni su etichette e schede di dati di sicurezza

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Colture	Dosi (l/ha)	Epoca d'impiego	Infestanti
Vite, Pomacee, Drupacee, Nocciolo, Arancio, Limone, Pompelmo	2*	Pre-emergenza delle infestanti	<i>Alopecurus</i> spp. (Coda di topo), <i>Poa annua</i> (Fienarola annua), <i>Lolium temulentum</i> (Zizzania), <i>Capsella bursa pastoris</i> (Borsa del pastore), <i>Matricaria</i> spp. (Camomilla), <i>Stellaria</i> spp. (Centocchio), <i>Papaver</i> spp. (Papavero), <i>Cerastium</i> spp. (Peperina), <i>Ranunculus</i> spp. (Ranuncolo), <i>Vicia</i> spp. (Veccia), <i>Convolvulus arvensis</i> (Vilucchio comune), <i>Calystegia sepium</i> (Vilucchio bianco), <i>Oxalis</i> spp. (Acetosella).
		Post-emergenza delle infestanti (usare in miscela con erbicidi ad attività fogliare)	
		Post-emergenza su graminacee perenni: <i>Cynodon</i> spp., <i>Agropyron</i> spp., <i>Agrostis</i> spp., <i>Bromus</i> spp. (usare in miscela con graminicidi specifici)	
Girasole	1*	Pre-emergenza della coltura	

*di superficie effettivamente trattata