

Serenade® Aso

Serenade Aso è la nuova formulazione liquida di *Bacillus subtilis* (ceppo QST 713) per il controllo biologico di numerose patologie fungine e batteriosi, che promuove la vigoria, la radicazione e la produzione delle naturali difese nella pianta.



SERENADE[®] ASO

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE L/ha	MODALITÀ D'IMPIEGO	TEMPO di CARENZA gg
Vite	Botrite Marciume acido	4	Dallo stadio di inizio fioritura fino a raccolta.	-
Melo, Pero	Colpo di fuoco Maculatura bruna del pero	4-8	Dallo stadio di inizio fioritura fino a completo sviluppo dei frutti.	-
Pesco, Nettarino, Albicocco, Ciliegio, Susino, Mandorlo	Moniliosi Batteriosi	4-8	Dallo stadio di pre-fioritura fino a pre-raccolta.	-
Agurmi	Batteriosi	4-8	Intervenire dallo stadio di pre-fioritura fino a pre-raccolta.	-
Kiwi	Batteriosi Botrite	4-8	Intervenire dallo stadio di sviluppo delle foglie fino a raccolta.	-
Olivo	Occhio di pavone Lebbra Rogna	4-8	Intervenire dallo stadio di sviluppo delle foglie fino a raccolta.	-
Fragola, Frutti di piante arbustive (More di rovo, More selvatiche, Lamponi rossi e gialli) Altra piccola frutta e bacche (Mirtilli, Mirtilli giganti americani, Ribes a grappoli nero, rosso, bianco, Uva spina/grossularia verde, rossa e gialla, Rosa canina, More di gelso nero e bianco, Azzeruoli, Bacche di sambuco, altri)	Botrite	4-8	Dallo stadio di pre-fioritura fino a raccolta.	-
Pomodoro, Melanzana, Peperone	Botrite Alternaria Batteriosi Fusariosi	4-8 fogliare oppure 10 al terreno	Intervenire da 3 foglie vere fino a raccolta; contro fusariosi 1 irrorazione al terreno per ciclo colturale, da semina/pre trapianto a 3 foglie vere.	-
Patata	Rizottoniosi	5	Applicare nel solco di semina tramite irrorazione.	-

COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE L/ha	MODALITÀ D'IMPIEGO	TEMPO di CARENZA gg
Cetriolo (in serra)	Botrite	4-8	Da 3 foglie vere fino a raccolta.	-
Melone, Cocomero, Zucchini	Botrite Cancro gommoso	4-8	Intervenire da 3 foglie vere fino a raccolta.	-
Melone, Cocomero, Zucchini, Cetriolo	Fusariosi	10 (al terreno)	Intervenire con 1 applicazione al terreno da semina/pre trapianto a 3 foglie vere.	-
Lattughe e insalate, Erbe fresche e Fiori commestibili	Botrite Marciume del colletto Rizottoniosi	4-8 fogliare oppure 5 al terreno	Applicazioni fogliari dallo stadio di 3 foglie vere (da emergenza cotiledoni in serra) fino a raccolta o fino allo stadio di 3 foglie vere con 1 irrorazione al terreno per ciclo colturale.	-
Legumi freschi e da granella	Sclerotinia	4-8	Intervenire da 5 foglie vere fino a raccolta.	-
Barbabietola da zucchero	Cercosporiosi Oidio	4	Dallo stadio di sviluppo della rosetta fino a raccolta.	-
Colza	Sclerotinia	2	Dallo stadio di inizio fioritura fino a fine fioritura.	-
Riso	Brusone Elmintosporiosi	4-8	Intervenire dallo stadio di allungamento del culmo principale fino a raccolta.	-
Ornamentali e Rose	Oidio	5	Da 3 foglie vere.	-



4 x 5 L



Composizione: *Bacillus subtilis* ceppo QST 713 1,34% (= 14,1 g/L)

Formulazione: Sospensione concentrata

Classificazione: -

Registrazione: n. 16780 del 22.07.2016

© = Marchio registrato