



# FORTEZZA®

## INSECTICIDA

**Fortezza** è un insetticida-acaricida a base di abamectina. Il prodotto è attivo contro tutti gli stadi mobili di acari, tripidi e minatrici fogliari che attaccano colture orticole, ornamentali e floricole in serra. Dopo l'esposizione, gli insetti target rimangono immediatamente immobilizzati, ma possono essere richiesti da 3 a 5 giorni per il raggiungimento della mortalità massima. Durante questo periodo di tempo i parassiti hanno un'alimentazione molto limitata e il danneggiamento sulla pianta è minimo. Fortezza è inoltre autorizzato per trattamenti endoterapici su conifere e latifoglie di alberature stradali e parchi.

## ALBAUGH: LA TUA ALTERNATIVA

- Azione traslaminare prolungata
- Autorizzato per le principali colture orticole
- Ampia possibilità d'impiego su floreali e ornamentali
- Autorizzato per uso endoterapico
- Elevata solubilità

## AVVERTENZE AGRONOMICHE

Non applicare durante le ore più calde del giorno, su foglie bagnate o in caso di pioggia imminente. Non trattare quando le condizioni del tempo favoriscono fenomeni di deriva. **Fortezza** è altamente tossico per le api esposte all'irrorazione diretta. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare durante il periodo della fioritura e nei 10 giorni precedenti. Sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione, comprese le zone vicino alla coltura. Trattare preferibilmente nelle ore serali quando le api non sono in attività. Durante l'applicazione in serra, chiudere e coprire le colonie dei bombi. Per proteggere le api mantenere la serra chiusa per 24 ore dopo il trattamento. **Sono autorizzati solo gli usi nelle serre permanenti ed in endoterapia.**

## COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con gli insetticidi e fungicidi di comune impiego.

## FITOTOSSICITA'

Il prodotto è generalmente selettivo per le colture indicate in etichetta; per le colture orticole e floricole, in caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione, si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste. Non impiegare il prodotto su margherite Shasta (*Leucanthemum spp.*).

## DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Colture	Avversità	Dosi (ml/hl)	Dosi (l/ha)	Note	N max tratt./anno	Carenza gg
<b>Pomodoro, Melanzana</b> (serra permanente)	Ragnetto rosso, Eriofide	60	0,3-1,2	Alla comparsa dei primi stadi mobili	2	7
	Larve di <i>Frankliniella occidentalis</i>	75	0,75-1,2	Alla comparsa delle prime larve		
<b>Melone, Cetriolo, Peperone</b> (serra permanente)	Minatrici fogliari	60	0,3-1,2	Alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni	2	3
<b>Fragola</b> (serra permanente)	Ragnetto rosso	40	0,5	Alla comparsa dei primi stadi mobili, in 2 applicazioni ogni 7-10 giorni; oppure 100 ml/hl (1,2 l/ha) in una sola applicazione	2	7
	Larve di <i>Frankliniella occidentalis</i>	75	0,75-1,2	Alla comparsa delle prime larve		
<b>Colture ornamentali e floricole in terra e in vaso, Vivai di arbustive ed arboree</b> (serra permanente)	Minatrici fogliari ( <i>Liriomyza spp.</i> )	50	0,5-1,5	Alla comparsa delle prime punture di ovideposizione, intervenire ogni 7-10 giorni	2	-
	Larve di <i>Frankliniella occidentalis</i>	75	0,5-1,5	Alla comparsa delle prime larve		
	Ragnetto rosso comune	25-50	0,5-1,5	Alla comparsa dei primi stadi mobili		
<b>Latifoglie e Conifere per alberature stradali e parchi</b> (uso endoterapico)	Minatrice fogliare dell'ippocastano	10-40 ml/l di acqua		Iniettare il prodotto subito dopo la fioritura	2	-
	Processionaria del pino			Iniettare in presenza delle prime larve neoanate		
	Tingide del platano, Afidi, Acari tetranychidi ed eriofidi			Iniettare il prodotto alla ripresa vegetativa		

### COMPOSIZIONE

**Abamectina** 1,9% (18,37 g/l)

### FORMULAZIONE

Concentrato emulsionabile

### REGISTRAZIONE

n. 15119 del 23/03/2011

### CONFEZIONI

1 L / 5 L

### INDICAZIONI DI PERICOLO

ATTENZIONE



Scansionare il codice QR per le informazioni su etichette e schede di dati di sicurezza