

Algasco



| | | | |
|----|--------|-------|--------|
| 1L | 5-20 L | 120 L | 1000 L |
| | | | |

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

seaweed
extracts
20%



ESTRATTO DI ALGHE MARINE

CARATTERISTICHE

Algasco è un promotore di crescita costituito dal 20% di alghe (*Ascophyllum nodosum*), estratte a freddo mediante un processo enzimatico, che consente a acidi, polisaccaridi e altre sostanze naturali attive di mantenere intatte tutte le loro caratteristiche.

Tali sostanze hanno un **effetto biostimolante** in grado di migliorare la crescita delle piante, il superamento degli stress e lo sviluppo radicale. Algasco consente inoltre di migliorare: l'equilibrio tra fase vegetativa e fase riproduttiva; la produttività delle piante; **le dimensioni, l'uniformità e le caratteristiche qualitative dei frutti** (contenuto zuccherino, colore, consistenza, sorbevolezza).

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

EC 1:100 0.55 mS/cm | pH 4.15 | pH 1:100 6.6 | Dens. 1.1 g/cm³.



SEAWEED EXTRACT

CHARACTERISTICS

Algasco is a growth promoter made up of 20% seaweeds (*Ascophyllum nodosum*), cold-pressed through an enzymatic process, allowing acids, polysaccharides and other natural active substances to keep their characteristics.

Such substances have a **biostimulant effect** able to improve: plants growth, resistance against stress and root development.

Algasco provides many benefits, in particular: vegetal and reproductive balance; plants productivity; size, uniformity and qualitative characteristics of fruits (sugar content, colour, texture, tastefulness).

CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES

EC 1:100 0.55 mS/cm | pH 4.15 | pH 1:100 6.6 | Dens. 1.1 g/cm³.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS

| COLTURE / CROPS | MODALITÀ D'IMPIEGO / METHODS OF USE | ml/l | l/ha |
|-----------------|--|-------|--------|
| | 3 applicazioni: boccioli fiorali, dopo allegagione e accrescimento oliva. 3 applications: flower buds, after fruit setting and olive growth. | 1 - 2 | 8 - 10 |
| | 5 applicazioni: germogliamento, pre-fioritura, allegagione, accrescimento acini e 4 settimane prima della vendemmia. / 5 applications: sprouting, pre-flowering, fruit setting, grape growth and 4 weeks before harvesting. | 1 - 2 | 8 - 10 |
| | 4 applicazioni: boccioli fiorali, dopo allegagione, accrescimento frutti e dopo 20 gg dalla precedente. / 4 applications: flower buds, after fruit setting, fruit growth and 20 days after the previous application. | 1 - 2 | 8 - 10 |
| | 3 - 4 applicazioni: a partire da 8 - 10 gg dopo il trapianto. 3 - 4 applications: starting from 8 - 10 days post-transplanting. | 1 - 2 | 8 - 10 |

Per un volume d'acqua di 1000 l/ha. / For a water volume of 1000 l/ha.

Anche in miscela con i comuni fertilizzanti idrosolubili. / Also mixed with common water-soluble fertilizers.