



QUIMERA®

FUNGICIDA

Quimera è un fungicida di copertura dotato di movimento traslaminare appartenente alla famiglia degli analoghi delle strobilurine. Il prodotto inibisce la germinazione delle spore e limita la sporulazione, pertanto risulta particolarmente indicato per interventi preventivi su Ticchiolatura e Maculatura bruna del Pero, Ticchiolatura e Oidio del Melo, Oidio e Marciume nero della vite e Occhio di pavone su olivo.

ALBAUGH: LA TUA ALTERNATIVA

- Efficacia e resistenza al dilavamento
- Non determina rugginosità sui frutti
- Ottima selettività su insetti utili
- Non influenza le fermentazioni e le caratteristiche organolettiche dei vini
- Rapida degradazione nel suolo

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Distribuire il prodotto con volumi d'acqua di 800-1000 litri/ha per pomacee; 300-1000 l/ha per vite; 500-1000 l/ha per olivo. In ogni caso impiegare sempre la dose di prodotto consigliata per ettaro, indipendentemente dal volume di acqua usato. Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza impiegare Quimera in via preventiva, alternandolo con prodotti aventi differente meccanismo d'azione. Su vite effettuare al massimo 4 trattamenti/anno con prodotti inibitori della respirazione mitocondriale (QoI). In caso di elevata pressione della malattia e/o rapido sviluppo della nuova vegetazione si consiglia di ridurre l'intervallo tra un'applicazione e l'altra; comunque non superare i 15 giorni d'intervallo tra i trattamenti.

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con altri agrofarmaci.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Colture	Avversità	Dosi (g/ha)	Note	N max tratt/anno	Carenza gg
Melo	Ticchiolatura, Oidio	200	Trattare allo sviluppo delle infiorescenze e successivamente ogni 12-14 giorni.	3	35
Pero	Ticchiolatura, Maculatura bruna	200	Trattare allo sviluppo delle infiorescenze e successivamente ogni 12-14 giorni.	3	35
Vite	Oidio, Marciume nero o Black rot	300	Iniziare le applicazioni alla comparsa dei grappoli, quando la sensibilità ad entrambi i patogeni inizia ad aumentare e successivamente ogni 12-14 giorni.	2	35
Olivo	Occhio di pavone	200	Trattare dall'inizio dello sviluppo dei bottoni fiorali fino alla mignolatura; interventi ogni 14 giorni	2	Non raccogliere prima della piena maturazione

COMPOSIZIONE

Kresoxim-methyl 50%

FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili

REGISTRAZIONE

n.15988 del 30/11/2018

CONFEZIONI

1 Kg

INDICAZIONI DI PERICOLO

ATTENZIONE



Scansionare il codice QR per le informazioni su etichette e schede di dati di sicurezza