



# PLANTOIL®



## INSECTICIDA

Plantoil è un prodotto ad alta concentrazione di olio paraffinico.

Si contraddistingue per l'elevato potere insetticida verso tutti i tipi di cocciniglie e acari, risultando efficace anche contro la fumaggine causata da attacchi di cocciniglie. Agisce per contatto provocando asfissia su uova e stadi immaginali di fitofagi e acari.

## ALBAUGH: LA TUA ALTERNATIVA

- Adatto per colture frutticole
- rativa formulazione (facilità di dosaggio e utilizzo)
- Sicuro per l'operatore
- Distribuzione uniforme (massima efficacia)
- Utilizzabile in agricoltura biologica

## AVVERTENZE AGRONOMICHE

Distribuire il prodotto con volumi d'acqua di 500-1000 l/ha per vite e olivo, 500-1500 l/ha per pomacee e drupacee, 1000-2000 l/ha per agrumi; 1500-2500 l/ha per banana. È consigliabile l'utilizzo di un agente antischiuma qualora si formi una quantità eccessiva di schiuma nel serbatoio. La miscela va mantenuta in costante agitazione per tutta la durata del trattamento e anche durante eventuali fermate.

## COMPATIBILITA'

Il prodotto non è miscibile con prodotti a base di zolfo, polisolfuri, captano o folpet. Non applicare prima che siano trascorsi almeno 40 giorni dal trattamento con suddetti prodotti.

## FITOTOSSICITA'

Non effettuare il trattamento in giornate calde e secche.

## DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Colture	Avversità	Dosi (l/hl)	Dosi (l/ha)	Note	N max tratt/anno
Agrumi: Arancio, Limone, Mandarino, Limetta, Pompelmo	Acari ( <i>Panonychus citri</i> , <i>Eutetranychus banksi</i> , <i>Tetranychus urticae</i> )	1-1,5	10-30	Intervenire prima dell'invasione	1
	Cocciniglie ( <i>Aonidiella aurantii</i> , <i>Aspidiotus nerii</i> , <i>Lepidosaphes</i> <i>spp</i> , <i>Parlatoria pergandii</i> )				
Pomacee: Melo, Pero, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Cocciniglia ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> )	0,75-1	3,75-15	Intervenire prima dell'invasione	1
Drupacee: Pescio, Nettarine, Albicocco, Susino, Ciliegio	Cocciniglie ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> , <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> )	0,75-1	3,75-15	Intervenire prima dell'invasione	1
Olivo	Cocciniglia mezzo grano di pepe ( <i>Saissetia oleae</i> )	1,5-3	15	Intervenire prima della fioritura o tra allegazione e inizio indurimento nocciolo (BBCH 71-75)	1
Vite	Cocciniglie ( <i>Parthenolecanium corni</i> , <i>Planococcus citri</i> )	1,5-3	15	Trattamenti invernali in pre- fioritura	1
	Acari ( <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus ulmi</i> )			Intervenire alla comparsa degli adulti	
Banano	Acari ( <i>Tetranychus urticae</i> )	1,2-2	30	Intervenire alla comparsa degli adulti	1
	Cocciniglie ( <i>Dysmicoccus grassii</i> )			Intervenire alla comparsa dei grappoli floreali	

## COMPOSIZIONE

### Olio di paraffina

(al 98% di insolfonibilità)  
94% (790 g/l)

## FORMULAZIONE

Concentrato emulsionabile

## REGISTRAZIONE

n. 15765 del 18/12/2013

## CONFEZIONI

1 L / 5 L / 10 L / 20 L

## INDICAZIONI DI PERICOLO

PERICOLO



Scansionare il codice QR per le informazioni su etichette e schede di dati di sicurezza