



FUNGICIDA DI CONTATTO PER IL CONTROLLO DELLA PERONOSPORA ED ESCORIOSI DELLA VITE E DIVERSE MALATTIE FUNGINE DEL POMODORO

A base di Folpet, FALTEX 50 SC è un multisito ad azione preventiva in grado di controllare l'agente patogeno grazie a tre diverse modalità di azione. Ha un'attività su diverse malattie come Peronospora, Escoriosi ed azione collaterale su Botrite e altre malattie fungine del pomodoro. FALTEX 50 SC è una formulazione liquida in sospensione concentrata dotata di una elevatissima miscibilità e stabilità.

FUNGICIDA



Vite



Orticolie

COMPOSIZIONE

Folpet 40%
(500 g/kg)

FORMULAZIONE

sospensione concentrata

INDICAZIONI DI PERICOLO

ATTENZIONE



NUMERO DI REGISTRAZIONE

18394 del 26.7.23

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COLTURE	PATOGENI	Dosi (l/ha)	DOSE MAX (l/ha)	EPOCHE D'IMPIEGO	N° MASSIMO TRATTAMENTI PER ANNO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Vite (uva da vino)	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	0,2-2	0,2-2	Applicare quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia.	10	28 gg
	Escoriosi (<i>Phomopsis viticola</i>)	0,5-1,5	3	Eseguire i trattamenti allo stadio di 7-8 foglie, a partire dal germogliamento e dopo circa 1 settimana.	2 per escoriosi	
Pomodoro (in pieno campo)	Alternariosi (<i>Alternaria</i> spp.) Cladosporiosi (<i>Fulvia fulva</i>) Antracnosi (<i>Colletotrichum coccodes</i>)	0,25-0,5	2,5	Effettuare i trattamenti dallo stadio di 3-4 foglie fino a 7 giorni prima della raccolta.	4	7 gg
Pomodoro (in serra)	Septoriosi (<i>Septoria lycopersici</i>) Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,25-0,32	3,2	Effettuare i trattamenti dallo stadio di 3-4 foglie.	3	

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

Il prodotto non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuro e Olio bianco.

Inoltre, devono trascorrere almeno 20 giorni da un'applicazione con oli minerali e prodotti a base di zolfo.

CONFEZIONI



flaconi da **1 l**
in cartoni da 12 pezzi

taniche da **10 l**

