

VOLKETE

Insetticida per vite, pomacee, drupacee, solanacee, ortaggi a foglia

Sospensione Concentrata (SC)

Meccanismo d'azione: IRAC 5

VOLKETE - Registrazione Ministero della Salute n. 18186 del 03/04/25

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Spinosad puro 44,04 g (=480 g/l)

Coformulanti q.b. a 100 g

INDUSTRIAS AFRASA S.A.

C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro

E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Tel. +34 961321700



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla normativa nazionale.

Stabilimenti di produzione:

INDUSTRIAS AFRASA S.A. - C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Albaugh TKI d.o.o. - Grajski Trg 21, SI-2327 - Rače, Slovenia

Taglia: 100 – 200 – 250 – 500 ml, 1 – 2 – 5 – 10 L

Partita n. vedi corpo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di:

- 15 metri oppure usare ugelli che riducano la deriva dell'80% oppure 10 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 50% in caso di applicazioni precoci su vite;
- 10 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 75% oppure 20 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 50%, oppure utilizzare ugelli che riducano la deriva del 95%, in caso di applicazioni tardive su vite;
- 10 metri oppure 5 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 50%, oppure utilizzare ugelli che riducano la deriva dell'80%, in caso di applicazioni su solanacee;
- 30 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 70% in caso di applicazioni precoci su pomacee e drupacee;
- 10 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 90%, oppure 20 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 75%, in caso di applicazioni tardive su pomacee e drupacee;
- 10 metri oppure ugelli che riducano la deriva dell'80%, oppure 5 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 50%, in caso di applicazioni su ortaggi a foglia.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata da zona non coltivata o colture adiacenti di:

- 10 metri oppure 1 metro utilizzando ugelli che riducano la deriva del 75%, in caso di applicazioni su vite;
- 15 metri oppure 5 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 90% in caso di applicazioni tardive su vite;
- 15 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 90% in caso di applicazioni precoci su pomacee e drupacee;
- 30 metri oppure 10 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 90% in caso di applicazioni tardive su pomacee e drupacee;
- 5 metri oppure 1 metro utilizzando ugelli che riducano la deriva del 75%, per solanacee e ortaggi a foglia in campo.

Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non utilizzare quando le api sono in attività. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. Eliminare le piante infestanti prima della fioritura.

Per gli impieghi su vite, pomacee e drupacee indossare indumenti da lavoro durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione.

Per gli impieghi su solanacee, ortaggi a foglia, indossare indumenti e guanti da lavoro durante le fasi di miscelazione e carico, e indumenti da lavoro durante l'applicazione.

Indossare indumenti da lavoro nelle operazioni di miscelazione, caricamento e applicazione in caso di uso in pieno campo.

Indossare guanti, indumenti protettivi, visiera nelle operazioni di miscelazione, caricamento e applicazione in caso di uso in serra.

Per impieghi su vite indossare indumenti da lavoro e rispettare un periodo di rientro di 3 giorni per le operazioni di rifinitura. Per le altre applicazioni, indossare indumenti da lavoro in caso di rientro in campo.

Non rientrare nell'area trattata o ventilare accuratamente le serre trattate finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Trattamento sintomatico. Non sono necessari antidoti specifici.

Consultare un Centro Antiveleni.

Etichetta/foglio illustrativo

CARATTERISTICHE

VOLKETE è un insetticida a base di Spinosad, principio attivo derivante da un batterio (*Saccharopolyspora spinosa*) naturalmente presente nell'ambiente.

Il prodotto agisce per ingestione e contatto e presenta attività translaminare. Controlla efficacemente Tripidi, Nottuidi, Tignole, Carpocapsa ed altri insetti dannosi alle più diffuse colture arboree (frutticole e vite) e orticole.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Applicare **VOLKETE** tramite irrorazioni fogliari assicurando una completa copertura della vegetazione. Effettuare le applicazioni al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo dei parassiti, alle dosi e condizioni riportate nella tabella sottostante. Effettuare un solo trattamento l'anno.

Coltura	Parassiti controllati	Epoca di impiego	Dosi d'impiego	Volumi d'acqua (L/ha)
Vite da tavola e da vino	Tignoletta della vite (<i>Lobesia botrana</i>)	Da grappoli visibili fino in prossimità della raccolta (BBCH 53-89)	158-200 mL/ha	500-1000
	Tripide occidentale (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	Dall'inizio della fase vegetativa fino in prossimità della raccolta (BBCH 11-89)	158-200 mL/ha	500-1000
Pomodoro, peperone, melanzana in campo e in serra	Nottuidi (<i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i>), Tignola del pomodoro (<i>Tuta absoluta</i>), Tripide occidentale (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	Dall'inizio della fase vegetativa fino in prossimità della raccolta (BBCH 14-89)	158-200 mL/ha	500-1000
Melo e pero	Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)	Da fine caduta petali/allegagione fino in prossimità della raccolta (BBCH 71-89)	158-200 mL/ha	800-1000
Pesco e nettarino	Tignola orientale (<i>Cydia molesta</i>)	Da inizio sviluppo germogli fino in prossimità della raccolta (BBCH 31-89)	158-200 mL/ha	800-1000
Albicocco		Da inizio sviluppo germogli fino a inizio caduta dei petali (BBCH 31-65)		
Lattughe e erbe fresche (incluse cerfoglio, crescione, crescione acquatico)	Larve di lepidotteri, Tripide occidentale (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	Dall'inizio della fase vegetativa fino in prossimità della raccolta (BBCH 10-49)	158-200 mL/ha	400-800
Rucola	Tripide occidentale (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	Dall'inizio della fase vegetativa fino in prossimità della raccolta (BBCH 10-49)	158-200 mL/ha	400-800

PREPARAZIONE DELLA MISCELA - Riempire la metà del serbatoio dell'irroratrice con acqua e aggiungere la quantità prevista di prodotto. Mettere in funzione l'agitatore e completare il riempimento mantenendo la soluzione in agitazione fino alla fine dell'applicazione. Preparare solo la quantità di miscela necessaria al trattamento.

COMPATIBILITÀ - Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, LATTUGHE ED ERBE FRESCHE, RUCOLA; 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU MELO, PERO, PESCO, NETTARINO, ALBICOCCO; 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU VITE

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

VOLKETE

Insetticida per vite, pomacee, drupacee, solanacee, ortaggi a foglia

Sospensione Concentrata (SC)

Meccanismo d'azione: IRAC 5

VOLKETE - Registrazione Ministero della Salute n. 18186 del 03/04/25

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Spinosad puro 44,04 g (=480 g/l)

Coformulanti q.b. a 100 g



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla normativa nazionale.

INDUSTRIAS AFRASA S.A.

C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro

E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Tel. +34 961321700

Stabilimenti di produzione: INDUSTRIAS AFRASA S.A. - C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Albaugh TKI d.o.o. - Grajski Trg 21, SI-2327 - Rače, Slovenia

Taglia: 100 ml

Partita n. vedi corpo della confezione

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO

NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE