

# Hereu® SC

**Erbicida selettivo ad ampio spettro d'azione in sospensione concentrata.**

**Hereu® SC** è un erbicida selettivo a base di Oxyfluorfen per il controllo di un ampio spettro di infestanti annuali dicotiledoni e graminacee in applicazioni di pre e post-emergenza.

Agisce per contatto sulle infestanti presenti ma anche sulle plantule in via di emergenza.

COMPOSIZIONE	CODICE HRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Oxyfluorfen puro 42,9% (500 g/l)	E	Sospensione Concentrata (SC)	 <b>PERICOLO</b> Registrazione n°: 16033 del 04/06/2014



Flaconcino: 0,5 L  
 Cartone: 12x0,5 L  
 Pallet: 510 L



Flacone: 1 L  
 Cartone: 12x1 L  
 Pallet: 600 L

Visita  
 la pagina  
 prodotto!



## EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (l/ha)	PHI (gg)
VITE POMACEE DRUPACEE NOCCIOLO ARANCIO LIMONE POMPELMO MANDORLO	<b>Infestanti sensibili:</b> <u>Monocotiledoni annuali:</u> Coda di topo ( <i>Alopecurus spp.</i> ) Digitaria ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Orzo ( <i>Hordeum vulgare</i> ) Panicum ( <i>Panicum dichotomiflorum</i> ) Setaria ( <i>Setaria spp.</i> ) Zizzania ( <i>Lolium temulentum</i> )	In pre-emergenza contro specie annuali  In post-emergenza consultare l'etichetta per i casi specifici	0,9	-
OLIVO	<u>Dicotiledoni annuali:</u> Amaranto ( <i>Amaranthus spp.</i> ) Betonica ( <i>Stachys annua</i> ) Centocchio dei campi ( <i>Anagallis arvensis</i> )	Su impianti in produzione fino a 7gg prima del raccolto	0,9	7
GIRASOLE	Crucifere in genere Datura ( <i>Datura stramonium</i> ) Papavero ( <i>Papaver spp.</i> ) Porcellana ( <i>Portulaca oleracea</i> )	In pre-emergenza Su colture con file di 70-75 cm trattare con banda di 20-25 cm	0,5	
CARCIOFO	Poligoni ( <i>Polygonum spp.</i> ) Senape ( <i>Sinapis arvensis</i> )	In pre-emergenza subito dopo l'impianto o la riattivazione della coltura	0,5-0,75	
		In post-emergenza	0,75-0,9	
VIVAI FORESTALI E ORNAMENTALI	<u>Dicotiledoni perenni</u> (nei trattamenti di post emergenza): Acetosella ( <i>Oxalis spp.</i> ) Artemisia ( <i>Artemisia spp.</i> ) Malva ( <i>Malva spp.</i> ) Ortica ( <i>Urtica dioica</i> ) Romici ( <i>Rumex spp.</i> )	Impiegare solo sulla fila della coltura	0,9	
AREE INCOLTE E SEDI FERROVIARIE	Stoppione ( <i>Cirsium arvense</i> ) Vilucchio ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	Applicare in pre-emergenza o con infestanti presenti o in post-emergenza precoce	0,5-0,9	

### VANTAGGI

- **Hereu® SC** è una soluzione di riferimento nel controllo delle infestanti del girasole in pre-emergenza.
- È il diserbante ideale in miscela con Glifosate per il controllo totale di un ampio spettro di infestanti.

### INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- **Compatibile glifosate.**
- Per tutte le indicazioni trattare il prodotto alla dose prevista con volumi di acqua pari a 400 - 800 l/ha.
- In tutte le colture il prodotto deve essere applicato in bande lungo la fila tra l'ultima decade di settembre e la prima di maggio. L'area delle bande (area trattata) non deve superare il 30% della superficie totale.
- La dose minima efficace riportata in etichetta si intende per ettaro.