



Kasko[®] Met

Composizione

Metalaxil 25%

Formulazione

Polvere bagnabile

Confezioni



1 kg (collo da n° 15 pz.)

Registrazione

n° 18109 del 13.09.2022



ATTENZIONE

Fungicida sistemico ad azione preventiva

Kasko[®] Met è un fungicida sistemico ad azione preventiva efficace nei confronti delle peronosporacee e di altre avversità delle colture. La sua spiccata sistemica consente la protezione anche della vegetazione sviluppatasi successivamente all'evento infettivo.

Una scelta vincente

Ottima traslocazione all'interno della pianta. Massima flessibilità per la lotta contro la Peronospora della vite, degli agrumi, della fragola e delle colture orticole.

Modalità d'impiego

Colture	Avversità	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Note	N° max tratt./anno	Periodo carenza
Vite	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	80-200	0,8	Iniziare i trattamenti a partire dall'epoca di pre-fioritura distanziandoli non meno di 10 e non più di 14 giorni l'uno dall'altro.	3	14 gg.
Arancio, Pompelmo	Fitofthora (<i>Phytophthora spp.</i>)	40-80	0,8	Per applicazioni fogliari. Effettuare i trattamenti dallo sviluppo della nuova vegetazione fino alla completa colorazione dei frutti. Non distanziare i trattamenti tra loro meno di 10 o più di 14 giorni.	3	14 gg.
				Applicazioni con impianto di irrigazione a goccia. Effettuare i trattamenti dallo sviluppo della nuova vegetazione fino alla completa colorazione dei frutti. Non distanziare i trattamenti tra loro meno di 10 o più di 14 giorni.	3	
Fragola (in serra)	Marciume del colletto (<i>Phytophthora spp.</i>)	-	1,5	Applicazioni tramite irrigatori a goccia. Effettuare i trattamenti a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino a tre settimane prima della raccolta. Non distanziare i trattamenti tra loro meno di 10 o più di 14 giorni.	3	14 gg.
Pomodoro (in campo e in serra)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>), Alternaria (<i>Alternaria solani</i>)	80-200	0,8	Effettuare i trattamenti a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino alla pre-maturazione dei frutti. Non distanziare i trattamenti tra loro meno di 10 o più di 14 giorni.	3	14 gg.
Peperone (in serra)		-	1,5	Applicazioni tramite irrigatori a goccia. Effettuare i trattamenti a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino a 3 settimane prima della raccolta. Non distanziare i trattamenti tra loro meno di 10 o più di 14 giorni.	3	14 gg.
Patata	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	80-200	0,8	Effettuare i trattamenti a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino a tre settimane prima della raccolta. Non distanziare i trattamenti tra loro meno di 10 o più di 14 giorni.	3	14 gg.
Lattughe e altre insalate, comprese foglie e germogli di Brassicacee, Spinaci e simili, Cavolfiore, Cavolo broccolo, Verza, Cavoletto di Bruxelles (in campo)	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i> , <i>Hyaloperonospora brassicae</i>)	80-200	0,8	Effettuare i trattamenti e a partire dalle prime fasi di sviluppo e fino a tre settimane prima della raccolta. Non distanziare i trattamenti tra loro meno di 10 o più di 14 giorni.	3	14 gg.

Agrofarmaco autorizzato dal Min. della Salute. Le informazioni soprariportate sono indicative e parziali, prima dell'uso leggere sempre l'etichetta sul prodotto, con particolare attenzione alle frasi e simboli di pericolo

Kasko[®] Met: marchio registrato Gowan Italia.