

**CAPTAIN 48 SC**  
**Fungicida per melo e pero in sospensione concentrata**  
**Meccanismo d'azione: Gruppo M4 (FRAC)**

Composizione:  
100 g di prodotto contengono:  
- Captano puro: g 41,6 (480 g/L)  
- Coformulanti: q.b. a g 100



**ATTENZIONE**

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

H351 Sospettato di provocare il cancro;  
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea;  
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso; P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico; P501 Smaltire il prodotto ed il recipiente secondo le disposizioni locali; P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso; P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico; P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente; P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**Titolare della registrazione:**

**Sharda Europe bvba**  
Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek Belgium  
Tel. +39 02 3604 2884

**Autorizzazione Ministero della Salute n. 16649 del 02/10/2020**

**Stabilimenti di produzione e confezionamento:** Chemia S.p.A., S.S. km 46- S. Agostino (FE) // I.R.C.A. Service S.p.A.S.S. Cremasca 591 n°1 Fornovo S. Giovanni (BG) // AgroSmart Limited, Unit 1C, Victoria Court, Colliers Way, Clayton West Huddersfield, West Yorkshire, HD8 9TR (UK).

**Stabilimenti di confezionamento:** AGROPAK Spółka Jawna Brzeziński i wspólnicy 43-603 Jaworzno Darwina Id Polonia // Pakon Sp.z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin (Polonia) // AGROTOTAL Produtos Agroquimicos, S.A. R. Dos Navegantes, No. 48 - R/C Esq. 1200 - 732 Lisboa Portogallo // Móraagro Kft. 3937 Komlóská, Rákóczi út 121. Ungheria // FARMA-CHEM S.A. SINDOS 570 22 P.O. BOX – 1026 THESSALONIKI, Grecia

**Taglie:** g 500 - kg 1-5-10-20-25

**Partita n.:**

**Prescrizioni supplementari**

Non contaminare l'acqua con il prodotto ed il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Usare guanti adatti durante le fasi di miscelazione, carico ed applicazione del prodotto e tuta da lavoro e stivali impermeabili durante l'applicazione. Per eventuali lavorazioni da svolgere dopo il trattamento, utilizzare guanti adatti ed adeguati indumenti da lavoro. Non rientrare nelle aree trattate prima che queste siano completamente asciutte.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di rispetto non trattata dai corpi idrici superficiali di 30 m di cui 20 m vegetati oppure una fascia vegetata di 20 m con utilizzo di attrezzature che riducano la deriva del 50% oppure una fascia vegetata di 10 m con utilizzo di attrezzature che riducano la deriva del 90%.

Non trattare nella fase di fioritura della coltura e prima del trattamento sfalciare le piante infestanti in fiore presenti nei filari delle colture.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). Terapia sintomatica. **Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.**

### Modalità e dosi di impiego

CAPTAIN 48 SC è un fungida preventivo, che agisce per contatto, da impiegarsi su melo e pero.

Coltura	Patogeno	Dose L/ha	Indicazioni di impiego	Note	N. max trattamenti/anno
Melo e Pero	Ticchiolatura	3,0 L/ha (1000-1500 lt acqua/ha)	Impiegare il prodotto dalla fine della fioritura. Tra un trattamento e quello successivo lasciare trascorrere minimo 10 giorni.	L'uso su fruttiferi è consentito solo mediante attrezzature che garantiscano un incremento della precisione e dell'accuratezza dell'applicazione e la minima dispersione al di fuori della vegetazione fogliare bersaglio e attraverso tecniche e modalità di trattamento a più basso impatto ambientale rispetto a quelle convenzionali (ad esempio riduzione dei volumi di irrorazione in funzione della parete o del volume da trattare, schermature per le emissioni, irroratrici schermate, irroratrici con campane di protezione, irroratrici a tunnel, irroratrici controllate da sensori, ecc.) affinché, pur mantenendo il tasso di applicazione sulle superfici bersaglio, venga garantita la dose efficace sulla superficie o volume fogliare e si riduca di almeno il 61% la quantità di prodotto distribuita al di fuori della stessa vegetazione del prodotto fitosanitario (quindi applicata per ettaro). Inoltre, dette attrezzature e tecniche di applicazione dovranno assicurare una riduzione di almeno il 20% della perdita di prodotto fitosanitario al suolo rispetto alle attrezzature e tecniche di applicazione convenzionali.	4

La quantità di prodotto fitosanitario complessivamente utilizzabile per ettaro non dovrà superare il limite di 9,1 L per ettaro.

**Compatibilità:** In caso di miscelazione effettuare dei saggi di compatibilità con il prodotto da miscelare.

**Fitotossicità:** Si sconsiglia l'impiego del prodotto su alcune varietà di Melo (Stark, Stayman, Delicious, Renetta del Canada) e di Pero (Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna).

Per ridurre l'insorgere di fenomeni di resistenza, si consiglia l'impiego di fungicidi con diverso meccanismo d'azione.

**Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta.**

**Attenzione:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vedersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.