



IL NUOVO ERBICIDA DI PRE-EMERGENZA, PRE-TRAPIANTO E POST-EMERGENZA PER LE PRINCIPALI COLTURE

DOMITREL 400 CS agisce inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli delle principali infestanti annuali graminacee e dicotiledoni. Le infestanti sono controllate anche nello stadio di plantula, purché le graminacee non abbiano superato lo stadio di 1-1,5 foglie e le dicotiledoni lo stadio di 2-3 foglie vere.

ERBICIDA



Frutta



Vite



Orticole



Oleaginose



Riso



Mais



Cereali



Floreali e Ornamentali

COMPOSIZIONE

Pendimethalyn 34,8%
(400 g/l)

FORMULAZIONE

sospensione acquosa concentrata di capsule (CS)

INDICAZIONI DI PERICOLO

ATTENZIONE

NUMERO DI REGISTRAZIONE

17398 del 24.4.19



DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

INFESTANTI	COLTURE	Dosi (l/ha)	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Infestanti sensibili:	Agrumi, Pomacee, Drupacee, Frutta a guscio, Vite	3	Post-raccolta	—
Graminacee	Fragola	3	Pre trapianto	
<i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Panicum dichotomiflorum</i>	Patata	3	Pre-emergenza	
Dicotiledoni	Carota	2,5	Pre-emergenza o in post-emergenza (3-4 foglie)	
<i>Anagallis arvensis</i> , <i>Lamium</i> spp., <i>Sinapis arvensis</i>	Aglio, Scalogno, Cipolla, Porro	2,5	Pre-emergenza o in post-emergenza (2-4 foglie) o pre-trapianto	
Infestanti mediamente sensibili:	Pomodoro, Melanzana, Peperone, Melone, Cavoli, Lattughe, Scarole, Cicorie	2,5	Pre-trapianto	
Graminacee	Carciofo	3	Pre-emergenza	
<i>Alopecurus myosuroides</i> , <i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Setaria</i> spp., <i>Sorghum halepense</i>	Leguminose, Soia	2,5	Pre-emergenza	
Dicotiledoni	Girasole	3	Pre-emergenza	
<i>Amaranthus</i> spp., <i>Chenopodium</i> spp., <i>Papaver rhoeas</i> , <i>Matricaria chamomilla</i> , <i>Polygonum</i> spp., <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Senecio vulgaris</i> , <i>Solanum nigrum</i> , <i>Urtica urens</i> , <i>Veronica</i> spp.	Riso (seminato in asciutta, compresi gli arginelli)	2,5	Pre-emergenza	
	Mais e Mais dolce	3	Pre-emergenza o post-emergenza (2 foglie)	
	Sorgo	3	Pre-emergenza	
	Cereali	2,5	Pre-emergenza o post-emergenza prima di inizio accestimento	
	Tappeti erbosi	2,5	Post-emergenza	
	Piante ornamentali, Pioppo, Vivai	3	Fase di dormienza	
	Tabacco	3	Pre-trapianto	

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

DOMITREL 400 CS si distribuisce impiegando 200-400 l/ha di acqua.

CONFEZIONI

flaconi da 1 l
in cartoni da 12 pezzi

taniche da 5 l
in cartoni da 4 pezzi

