



COADIUVANTE PER MISCELE ERBICIDE

ETRAVON PRO è un coadiuvante appositamente studiato per conferire una migliore bagnabilità alle soluzioni erbicide cui viene aggiunto. Come conseguenza, vi è un più rapido e completo assorbimento dell'erbicida cui viene associato che determina un aumento dell'efficacia nei confronti delle infestanti sensibili, in particolare di quelle più sviluppate.

COADIUVANTE



Cereali



Mais



Oleaginose



Riso

COMPOSIZIONE

Sale sodico di Alchiletere Solfato
26,84% (276,5 g/l)

FORMULAZIONE

liquido solubile

NUMERO DI REGISTRAZIONE

16194 del 9.12.14

INDICAZIONI DI PERICOLO

ATTENZIONE



DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COLTURE	Dosi	INTERVALLO DI SICUREZZA
In aggiunta a erbicidi	1 - 2 l/ha nelle applicazioni con erbicidi	—

ETRAVON PRO può essere utilizzato sulle colture indicate in miscela con i seguenti erbicidi:

FRUMENTO (tenero e duro)

- Sulfoniluree (in formulazione WG) in miscela con Triazolinoni in post-emergenza della coltura, dalla 3^a foglia alla fine dell'accestimento, alla dose di 1,0-2,0 l/ha.

FRUMENTO (tenero e duro), ORZO, SEGALE, AVENA, TRITICALE

- Sulfoniluree (in formulazione WG) da sole o in miscela tra loro in post-emergenza della coltura, dalla 3^a foglia al secondo nodo di levata alla dose di 1,0-2,0 l/ha.
- Triazolopirimidine da sole o in miscela con Sulfoniluree, in post emergenza della coltura, da inizio accestimento a inizio levata, alla dose di 1,0 l/ha.

MAIS

- Sulfoniluree (in formulazione WG) da sole o in miscela con derivati dell'acido benzoico in post-emergenza della coltura, dalla 2^a alla 6[°] foglia, alla dose di 1,0 l/ha.

SOIA

- Sulfoniluree (in formulazione WG) in post-emergenza della coltura, da 2-4 foglie vere, alla dose di 1,0 l/ha.

RISO

- Sulfoniluree (in formulazione WG) e Triazolopirimidine in post-emergenza della coltura, dalla 2^a foglia al 4[°] livello di accestimento, alla dose di 1 l/ha.

CONFEZIONI

flaconi da 1 l
in cartoni da 12 pezzi

