



Bemotius®



INSETTICIDA NATURALE A BASE DI AZADIRACHTIN A PER LA PROTEZIONE DI AGRUMI, MELO, VITE, FRAGOLA, FLOREALI E ORNAMENTALI E NUMEROSE ORTICOLE IN CAMPO E SERRA

Il principio attivo di BEMOTIUS è estratto dai semi della pianta tropicale *Azadirachta indica* (albero del Neem).

Agisce come regolatore di crescita alterando lo sviluppo degli insetti, possiede inoltre azione disappetente e repellente. Agisce per contatto diretto ed ingestione.

È dotato di azione sistemica nella pianta, anche per assorbimento radicale e quindi traslocato sulla parte epigea. Esplica la sua azione su afidi, cocciniglie, aleurodidi, tripidi, cicaline e larve di lepidotteri su agrumi, vite, melo, fragola, floreali e ornamentali e numerose orticole.

INSETTICIDA



Frutta



Vite



Orticole



Floreali e ornamentali

COMPOSIZIONE

Azadirachtin A 2,75%
(26 g/l)

FORMULAZIONE

concentrato emulsionabile

NUMERO DI REGISTRAZIONE

18288 del 20.1.23

INDICAZIONI DI PERICOLO

ATTENZIONE



DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COLTURE	PARASSITI	TRATTAMENTO	Dosi (l/ha)	EPOCHE D'IMPIEGO	N° MASSIMO TRATTAMENTI PER ANNO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Agrumi (arancia, limone, pompelmo, mandarino)	Afidi, Cocciniglie, Aleurodidi, Minatori fogliari (lepidotteri), Cicaline, Tripidi, <i>Ceratits</i> sp.	Fogliare	0,75-1,5	Applicazioni preventive o alla comparsa dei parassiti. Il trattamento può essere ripetuto dopo 7-10 giorni in funzione del ciclo biologico degli insetti.	3	7 gg
Melo	Afidi, Minatori fogliari (lepidotteri), Cicaline, Larve di lepidotteri	Fogliare	1,0-1,5		3	3 gg
Vite	Cicaline, <i>Scaphoideus titanus</i> , Tripidi, Piralide della vite (<i>Sparganothis pilleriana</i>)	Fogliare	1,0-1,5		2	3 gg
Fragola (in pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Nottuidi, Tripidi, Larve di Lepidotteri	Fogliare	1,0-1,5		3	7 gg
Fragola (in serra)		Applicazione al suolo (per irrigazione a goccia)*	1,5		5	1 gg
Pomodoro Melanzana (in pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Dorifora della patata, Minatori fogliari (Ditteri), Nottuidi, Tripidi, Tignola del pomodoro	Fogliare	1,0-1,5		3 (pomodoro e melanzana in campo)	3 gg
Peperone (in pieno campo)					5	
Pomodoro Melanzana Peperone (in serra)		Applicazione al suolo (per irrigazione a goccia)*	1,5		5	1 gg

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

Applicare il prodotto nelle ore fresche e poco luminose della giornata. In caso di applicazioni fogliari, assicurare la bagnatura uniforme della vegetazione.

Riempire per metà il serbatoio con acqua. Mettere in funzione l'agitatore ed aggiungere la dose necessaria di BEMOTIUS. Completare il riempimento del serbatoio mantenendo costantemente in funzione l'agitatore. La miscela va mantenuta in costante agitazione per tutta la durata del trattamento.

Non esporre il prodotto a temperature superiori ai 54°C. Il prodotto è stabile per un anno a temperatura ambiente.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COLTURE	PARASSITI	TRATTAMENTO	Dosi (l/ha)	EPOCHE D'IMPIEGO	N° MASSIMO TRATTAMENTI PER ANNO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Cetriolo, Zucchini, Melone, Cocomero, Zucca (in pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Dorifora della patata, Minatori fogliari (Ditteri), Nottuidi, Tripidi	Fogliare	1,0-1,5	Applicazioni preventive o alla comparsa dei parassiti. Il trattamento può essere ripetuto dopo 7-10 giorni in funzione del ciclo biologico degli insetti.	5	3 gg
Cetriolo, Zucchini, Melone, Cocomero, Zucca (in serra)		Applicazione al suolo (per irrigazione a goccia)*	1,5		5	1 gg
Lattughe e insalate Foglie di spinaci e simili Prodotti baby leaf Erbe fresche Fiori commestibili (in pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (Ditteri), Nottuidi	Fogliare	1,0-1,5		3	7 gg
Lattughe e insalate, Foglie di spinaci e simili, Prodotti baby leaf Erbe fresche, Fiori commestibili (in serra)		Applicazione al suolo (per irrigazione a goccia)*	1,5		5	7 gg
Ortaggi a bulbo (cipolla, aglio)	Tripidi	Fogliare	1,0-1,5		3	3 gg
Carota	Afidi, Ditteri e Larve di lepidotteri	Fogliare	1,0-1,5		3	3 gg
Cavolfiori Cavolo cappuccio Cavolo verza	Afidi, Nottuidi, Tignole	Fogliare	1,0-1,5		3	7 gg
Patata	Afidi, Dorifora della patata, Tignole	Fogliare	1,0-1,5		3	3 gg
Floreali e ornamentali (in pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Larve di lepidotteri, Minatori fogliari, Tripidi, Bombice dispari (<i>Lymantria dispar</i>),	Fogliare	1,0-1,5		5	—
Floreali e ornamentali (in serra)	Tortrice delle querce (<i>Tortrix viridana</i>), Processionaria del pino (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>)	Applicazione al suolo (per irrigazione a goccia)*	1,5		5	—

* Impieghi per irrigazione a goccia:

Intervenire dal post-trapianto delle colture subito dopo il superamento della crisi di trapianto, ripetendo i trattamenti ad intervalli di 10 giorni in funzione della pressione dei fitofagi o fitomizi target.



Registrazione Mitsui AgriScience International S.A./N.V.

CONFEZIONI

flaconi da 1 l
in cartoni da 12 pezzi

