



CARDIS®

NOVITA'

FUNGICIDA

Cardis® è un fungicida sistemico in granuli idrodispersibili a base di fosetil alluminio. Caratterizzato da una grande mobilità nella pianta, il prodotto penetra rapidamente nei tessuti e manifesta una sistemica ascendente e discendente che consente anche la protezione delle foglie non bagnate e/o formatesi dopo il trattamento.

Cardis® esplica la sua azione fungicida indirettamente, stimolando le difese naturali della pianta con produzione di fitolessine e fenoli. Tale meccanismo evita l'insorgenza di patogeni resistenti.

ALBAUGH: LA TUA ALTERNATIVA

- Rapida penetrazione nei tessuti
- Sfugge al dilavamento
- Elevata sistemica (ascendente/discendente)
- Efficacia prolungata, anche su vegetazione formata dopo il trattamento
- Ideale per strategie antiresistenza

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Distribuire il prodotto con volumi d'acqua di 400 - 2000 l/ha per cetriolo e zucchino in serra; 1000 l/ha per vite, melone e cocomero in campo e in serra; 1000 - 1500 l/ha per lattughe e simili in campo e serra; 1000 - 1200 l/ha per melo e pero; 2000 l/ha per agrumi. Rispettare la dose massima d'impiego di 8 kg s.a./ha/anno.

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è compatibile con formulati a base di rame o a reazione fortemente alcalina e con concimi fogliari contenenti azoto.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Culture	Avversità	Dosi (Kg/ha)	Note	N. max tratt/anno	Carenza gg
Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo	<i>Phytophthora spp.</i>	4,5-6	Suggeriti 2 trattamenti in primavera e 2 in autunno con 21-35 gg tra applicazioni consecutive; oppure 2 trattamenti in autunno-inverno con 21-35 gg tra applicazioni consecutive.	4	15
Vite	<i>Peronospora (Plasmopara viticola)</i>	2,5	Trattamenti preventivi in fase di attiva crescita con intervallo di 10-14 gg, in associazione con prodotti di copertura.	6	28
Melo, Pero	<i>Ticchiolatura (Venturia inaequalis, Venturia pyrina)</i>	1,5-1,8	Trattamenti preventivi in fase di attiva crescita con intervallo di 10-14 gg, in associazione con prodotti di copertura.	6	40
Cetriolo e Zucchini (in serra)	<i>Peronospora (Pseudoperonospora cubensis)</i>	4	Si raccomanda la dose ridotta di 1 Kg/ha subito dopo il trapianto. Intervallo tra le applicazioni 10-14 gg.	4	3
Melone, Cocomero (in campo e serra)	<i>Peronospora (Pseudoperonospora cubensis)</i>	2,5-3	Si raccomanda la dose ridotta di 1 Kg/ha subito dopo il trapianto. Intervallo tra le applicazioni 10-14 gg. In caso di forte pressione della malattia è consentito un trattamento alla dose massima di 4 Kg/ha. Non usare la dose massima nell'ultimo trattamento.	4	15
Lattughe e simili (in campo e serra)	<i>Peronospora (Bremia lactucae)</i>	2-3	Intervallo tra le applicazioni 10-14 gg. Si consiglia di effettuare una prova di selettività su <i>Lactuca sativa</i> var. romana prima dell'impiego.	2	15

COMPOSIZIONE

Fosetil Alluminio 80%

FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili

REGISTRAZIONE

n. 18654 del 10/05/2024

CONFEZIONI

1 Kg / 5 Kg

INDICAZIONI DI PERICOLO

Nessun pittogramma CLP



Scansionare il codice QR per le informazioni su etichette e schede di dati di sicurezza