



FUNGICIDA BIOLOGICO PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE FUNGINE DEL TERRENO SU ORTICOLE, VITE E COLTURE FLOREALI

TELLUS WP è un fungicida biologico a base di due ceppi di *Thricoderma* (*T. asperellum* e *T. gamsii*) in formulazione polvere bagnabile (WP). La selezione dei due ceppi di triconderma assicura una rapida colonizzazione delle radici e del terreno sottraendo spazio e nutrimento ai funghi patogeni e attaccandone per via enzimatica le loro pareti cellulari.

FUNGICIDA



COMPOSIZIONE	FORMULAZIONE	INDICAZIONI DI PERICOLO
<i>T. asperellum</i> (ceppo ICC 012) g 2 <i>T. gamsii</i> (ceppo ICC 080) g 2 (UFC unità formanti colonie 3x10 ⁷ per grammo)	polvere bagnabile NUMERO DI REGISTRAZIONE 16527 del 26.11.15	—

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COLTURE	PATOGENI	Dosi	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Carota, Ravanello	Particolarmente indicato nella prevenzione degli attacchi di funghi parassiti dell'apparato radicale e del colletto quali: <i>Armillaria mellea</i> <i>Phytophthora</i> spp. <i>Pythium</i> spp. <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <i>Sclerotium rolfsii</i> <i>Thielaviopsis basicola</i> <i>Verticillium dahliae</i>	Orticole In vivaio: Applicazione substrato: 0,25 kg/m ³ Immersione vassoi: 10 g/litro In serra o pieno campo: 2,5 kg/ha	Trattamento in vivaio: al substrato o al vassoio Trattamento in serra/pieno campo: 2 applicazioni, la prima 5-7 giorni prima del trapianto o semina, la seconda alla semina o al trapianto	3 gg
Zucchini, Melone, Cetriolo				
Lattughe ed altre insalate comprese le brassicacee				
Finocchio, Sedano, Basilico, Erbe aromatiche				
Fragola				
Carciofo, Spinacio				
Fagiolo, Fagiolino				
Floricole ed ornamentali		Floricole ed ornamentali In vivaio: Applicazione substrato: 0,25 kg/m ³ Immersione vassoi: 10 g/litro In serra o pieno campo: 2,5 kg/ha		

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

Applicare TELLUS WP quando la temperatura del terreno è almeno di 10°C. TELLUS WP può essere applicato anche con gli impianti di fertirrigazione.

È consigliabile preparare una sospensione di TELLUS WP 24-36 ore prima del trattamento miscelando 500 g di prodotto con 5 litri di acqua per favorire la germinazione delle spore.

Compatibilità: è preferibile applicare il prodotto da solo distanziando di 10 giorni eventuali trattamenti con altri agrofarmaci; TELLUS WP non è compatibile con i formulati a base di Ziram, Imazalil, Prochloraz.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COLTURE	PATOGENI	DOSI	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Vite	Mal d'esca	250 g/hl	Dopo la potatura, invernale o primaverile, intervenire irrorando sul tralcio con ferite esposte la sospensione, avendo cura di dirigere il getto degli ugelli quanto più possibile sui tagli della potatura. Impiegare un volume di trattamento non inferiore a 400 l/ha per distribuire almeno 1 kg di prodotto a ettaro ed eseguire l'applicazione non oltre la fine della fase di pianta della vite. Nei vigneti a forte rischio di malattia (reimpianto su vigneto fortemente colpito, elevata presenza di malattia nei vigneti circostanti) l'intervento dopo la potatura primaverile può essere seguito da un secondo trattamento entro la fase di germogliamento, allo stesso dosaggio, per aumentare il grado di colonizzazione delle ferite.	3 gg
Pero	Maculatura bruna	2,5 kg/ha	Trattare il cotico erboso nel periodo compreso fra l'inizio della fioritura e la caduta dei petali. Ripetere il trattamento quando si verificano le condizioni predisponenti le infezioni sulla pianta.	
Drupacee	Cancri rameali, Deperimento delle drupacee	1 kg/ha	Trattare a partire dall'inizio della fioritura fino alla caduta delle foglie, ripetendo il trattamento fino a 4 volte.	
Colture arboree da frutto, Piante ornamentali e forestali	Armillaria	2,5 kg/ha	Nuovi impianti: un'applicazione in pre trapianto e un'applicazione al momento dell'impianto. Colture già impiantate: un'applicazione prima del risvegli vegetativo e una applicazione prima del riposo vegetativo.	
Per colture floricole, ornamentali e orticole: trattare le piantine provenienti da semenzaio, prima della messa a dimora definitiva immergendo i pani di terra o i contenitori alveolari per alcuni minuti in una sospensione ottenuta con 10 grammi di TELLUS WP ogni litro di acqua. Trapiantare poi in terreno precedentemente trattato con TELLUS WP con 250 gr di TELLUS WP ogni 1000 m ² di superficie.				

CONFEZIONI

scatole da **1 kg**
in cartoni da 10 pezzi



Registrazione Gowan Italia S.r.l.

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Catalogo Syngenta 2025