



FUNGICIDA IN FORMULAZIONE LIQUIDA A BASE DI RAME SOLFATO TRIBASICO

COPRANTOL TRIO è un fungicida a base di rame solfato tribasico (TBCS) formulato in sospensione concentrata.

La formulazione liquida garantisce praticità d'uso e facilità di dosaggio.

La componente rameica a base di rame solfato tribasico ad azione di contatto garantisce un ottimo grado di copertura, resistenza al dilavamento e garantisce una elevata e costante attività fungicida e battericida.

FUNGICIDA



COMPOSIZIONE

Rame metallo 12%
(142 g/l)

(sotto forma di rame solfato tribasico)

FORMULAZIONE

sospensione concentrata

NUMERO DI REGISTRAZIONE

13856 del 3.7.07

INDICAZIONI DI PERICOLO

ATTENZIONE



DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COLTURE	PATOGENI	Dosi (l/ha)	Dosi (l/ha)	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Vite	Peronospora Escoriosi Marciume nero o Black-rot	330-450	3,3-4,5	Effettuare i trattamenti dalla terza foglia distesa fino a pre-fioritura e riprenderli da chiusura grappolo fino all'invaiaitura. Applicare il prodotto con un intervallo di 7-8 giorni per un massimo di 3-5 applicazioni anno e avendo cura di rispettare la dose più alta in caso di forte pressione della malattia.	21 gg
Melo Pero Cotogno	Cancro rameali Ticchiolatura, Muffa a cerchi, Colpo di fuoco batterico del pero	550 300-450	6,6-8,25 3,63-6,76	Trattamenti al bruno. Effettuare massimo 3-4 applicazioni anno ad un intervallo di 7-8 giorni. Dall'ingrossamento delle gemme alla comparsa dei mazzetti fiorali. Effettuare massimo 2-3 applicazione all'anno con un intervallo di 7-8 giorni.	—
Pesco Albicocco Ciliegio Susino	Bolla, Cancro rameale, Nerume o Cladosporiosi, Cilindrosporiosi del ciliegio, Scopazzi del ciliegio, Bozzacchioni del susino. Attività collaterale su batteriosi (<i>Xanthomonas</i> spp., <i>Pseudomonas</i> spp.)	550-700	5,5-8,36	Trattamenti al bruno per un numero massimo di 3-4 trattamenti anno e un intervallo di 14-21 giorni tra le applicazioni.	—
Nespolo	Ticchiolatura	350	3,52-4,22	Trattamenti al bruno per un massimo di 2-3 trattamenti/anno con un intervallo tra i trattamenti di 7-8 giorni.	—
Olivo	Occhio di pavone Fumaggine Rogna	500-600	5-6	Effettuare i trattamenti da stasi a ripresa vegetativa e da inizio maturazione drupe a raccolta con massimo di 3-4 applicazioni e con un intervallo tra i trattamenti di 7-8 giorni.	14 gg
Agrumi	<i>Phytophthora</i> spp. fumaggine	480-650	4,85-6,5	Effettuare i trattamenti in pre-fioritura (dalla schiusura delle gemme fiorali) con massimo di 3-4 applicazioni e con un intervallo tra i trattamenti di 7-8 giorni.	—

ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

Non trattare durante la fioritura. Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

Su pesco, susino e varietà di melo e pero cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.

Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Su varietà poco note di colture orticole, floreali e ornamentali effettuare piccoli saggi preliminari prima di impiegare il prodotto su larga scala.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COLTURE	PATOGENI	Dosi (l/ha)	Dosi (l/ha)	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Actinidia	Marciume del colletto, Alternaria, Maculatura batterica, Cancro batterico	800-850	8-8,5	Effettuare i trattamenti dalla dormienza fino a ripresa vegetativa con massimo di 1-3 applicazioni e con un intervallo tra i trattamenti di 7-14 giorni.	—
Noce Nocciolo Castagno Mandorlo	Mal dello stacco, Antracnosi del noce, Fersa del castagno. Attività collaterale contro: Macchie nere del noce, Necrosi batterica del nocciolo, Cancro batterico del nocciolo	450-470	4,5-4,75	Trattamenti al bruno con massimo di 2-3 applicazioni e con un intervallo tra i trattamenti di 7-8 giorni.	—
Piccoli frutti (in pieno campo)	Micosferella Cancro corticali	420-470	3,4-4,75	Effettuare i trattamenti da dormienza fino a ripresa vegetativa per un massimo di 2-3 applicazioni ad un intervallo di 7-14 giorni.	—
Fragola (in campo)	Vaiolatura. Attività collaterale su <i>Phytophthora</i> spp. e <i>Xanthomonas</i> spp.	250-320	2,5-3,25	Effettuare i trattamenti al trapianto per un massimo di 3-4 applicazioni ad un intervallo di 7-8 giorni.	7 gg
Pomodoro (in pieno campo e serra)	Peronospora. Attività collaterale su Marciume zonato e Batteriosi.	350-400	3,5-4	Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli alle malattie. Rispettare un intervallo tra i trattamenti di 7-8 giorni. Massimo 3-4 applicazioni anno.	3 gg da mensa 10 gg da industria
Melanzana (in pieno campo e serra)	Cancro pedale, Antracnosi. Attività collaterale su Batteriosi.	320-400	3,25-4	Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli alle malattie. Rispettare un intervallo tra i trattamenti di 7-8 giorni. Massimo 2-3 applicazioni anno.	3 gg
Cucurbitacee a buccia edibile (in pieno campo e serra)	Peronospora <i>Colletotrichum lagenarium</i> , Maculatura angolare	350-400	2,8-4	Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli alle malattie. Rispettare un intervallo tra i trattamenti di 7-8 giorni. Massimo 2-3 applicazioni anno.	3 gg
Cucurbitacee a buccia non edibile (in campo)					7 gg
Ortaggi a stelo: Carciofo, Asparago (in campo) (intervenire dopo la raccolta dei turioni)	Peronospora, Antracnosi <i>Septoria apiicola</i> . Attività collaterale su Batteriosi.	350-400	2,10-4	Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli alle malattie. Rispettare un intervallo tra i trattamenti di 7-8 giorni. Massimo 3-4 applicazioni anno.	3 gg carciofo — asparago
Legumi: Pisello, Pisello mangiatutto, Fagiolo, Fagiolino, Lenticchia (in pieno campo e serra)	Peronospora Alternaria Attività collaterale su Batteriosi.	350-400	2,10-4	Rispettare un intervallo tra i trattamenti di 7-8 giorni. Massimo 2-3 applicazioni anno.	3 gg
Ortaggi a bulbo, Cavoli a infiorescenza (in campo)					3 gg ortaggi a bulbo 14 gg cavoli
Patata (in campo)	Peronospora, Alternaria Attività collaterale su Batteriosi.	400-520	4-5,25	Rispettare un intervallo tra i trattamenti di 7-8 giorni. Massimo 3-4 applicazioni anno.	7 gg
Cipresso	Cancro del cipresso	480	3,8-4,8	Alla comparsa delle condizioni predisponenti allo sviluppo del patogeno. Effettuare 2-3 trattamenti anno ad intervallo 7-8 giorni.	—
Colture floreali (in pieno campo e serra)	Peronospora, Alternariosi. <i>Diplocarpon rosae</i> . Attività collaterale su Batteriosi.	230	1,35-2,25		

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni.

Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.



Registrazione GOWAN ITALIA S.r.l.

CONFEZIONI

flaconi da 1 l
in cartoni da 12 pezzi

taniche da 10 l

