

DELEGATE® 26

Insetticida in granuli idrodispersibili a base di spinetoram (nome commerciale "JEMVELVA™ active"), dotato di azione per ingestione e per contatto, per il controllo dei principali parassiti di pero, albicocco, ciliegio e olivo

GRANULI IDRODISPERSIBILI

Meccanismo d'azione: gruppo 5 (IRAC)

Composizione di DELEGATE 26

SPINETORAM puro (nome commerciale "JEMVELVA™ active") g. 25 (250 g/kg)

Coformulanti q. b. a g.100

Contiene 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one (CAS 2634-33-5)



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317: Può provocare una reazione allergica della pelle. H361f Sospettato di nuocere alla fertilità. H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso. P260: Non respirare i vapori/gli aerosol. P263: Evitare il contatto durante la gravidanza e l'allattamento. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare guanti e indumenti protettivi. P314: In caso di malessere, consultare un medico. P333+313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501: Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

Corteva Agriscienze Italia s.r.l. – Via dei Comizi Agrari, 10 – 26100 Cremona
Tel. +39 0372 709900

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Corteva Agriscienze Italia s.r.l. – Mozzanica (Bergamo) (prod e conf)
GOWAN MILLING LLC – Yuma, Arizona (USA) (prod e conf)
STI- Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (RA) (prod e conf)
Arco Logistica S.r.l - Ferrara (FE) (solo ri-etichettatura)

Taglia autorizzata 0.5 Kg

Registrazione n. 19247 del 12/03/2026 del Ministero della Salute
Partita n°: vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Indossare guanti e tuta/abbigliamento da lavoro durante la fase di miscelazione/caricamento del prodotto e durante l'applicazione. Indossare i guanti prima di effettuare operazioni di rifinitura manuale sulle colture trattate. In ogni caso, non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

Pericoloso per le api. **Per proteggere le api e altri insetti impollinatori** non applicare alle colture al momento della fioritura. Non utilizzare quando le api sono in attività. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. Eliminare le piante infestanti prima della fioritura.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le seguenti fasce di sicurezza non trattate da corpi idrici superficiali:

Pero, albicocco, ciliegio: 30 metri, di cui almeno 10 metri coperti da vegetazione, in associazione ad ugelli anti-deriva (30% di riduzione) e trattamento dell'ultimo filare solo verso l'interno del frutteto;

Olivo: 20 metri; oppure, 16 metri in associazione ad ugelli anti-deriva o trattamento dell'ultimo filare solo verso l'interno del frutteto; oppure, 12 metri in associazione ad ugelli anti-deriva (30% di riduzione) e trattamento dell'ultimo filare solo verso l'interno del frutteto.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 e 10 metri da zone non coltivate rispettivamente per pero/albicocco/ciliegio e olivo.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Trattamento sintomatico. Non sono necessari antidoti specifici. **Consultare un Centro Antiveneni.**

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Insetticida a base di *spinetoram* (JEMVELVA™ active), principio attivo derivante da un batterio (*Saccharopolyspora spinosa*) naturalmente presente nel terreno e successivamente modificato chimicamente. Attivo per ingestione e contatto su Psilla del pero (*Cacopsylla pyri*), moscerino asiatico della frutta (*Drosophila suzukii*), piralide dell'olivo (*Palpita unionalis*) e sputacchina (*Philaenus spumarius*).

Pero: è consentito al massimo un trattamento. Dosi riferite ad ettaro con volumi d'acqua di 1200-1500 litri.

Contro Psilla del Pero (*Cacopsylla pyri*/*Psylla pyri*), trattare in presenza del parassita allo stadio di uova gialle alla dose di 400 g/ha.

Albicocco, Ciliegio: è consentito al massimo un trattamento su Albicocco e 2 trattamenti su Ciliegio. Dosi riferite ad ettaro con volumi d'acqua di 1000-1500 litri.

Contro il Moscerino asiatico della frutta (*Drosophila suzukii*) trattare alla presenza del parassita con dosi di 300-400 g/ha su albicocco e 300 g/ha su ciliegio. In caso di aree con livelli di infestazione storicamente molto elevati, inserire il prodotto in uno specifico programma di controllo del parassita. **Su ciliegio è permesso un secondo trattamento con un intervallo minimo di 28 giorni.**

Olivo: Sono consentiti 2 trattamenti. Dosi riferite ad ettaro con volumi d'acqua di 1000-1500 litri.

Contro la piralide dell'olivo (*Palpita unionalis*) e la sputacchina (*Philaenus spumarius*), trattare alla presenza del parassita con dosi di 75 g/ha. Ripetere eventualmente il trattamento con un intervallo minimo di 28 giorni.

Conservazione: Il prodotto nel suo imballo originale sigillato ha una stabilità garantita di almeno 2 anni.

Compatibilità: il prodotto si impiega da solo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto, usato da solo, non ha evidenziato problemi di fitotossicità sulle varietà testate delle colture in etichetta

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti **3 giorni** prima della raccolta per ciliegio; **7 giorni** prima della raccolta per pero, albicocco, e **21 giorni** prima della raccolta per olivo.

Prevenzione e gestione della resistenza: per evitare o ritardare la comparsa di fenomeni di resistenza è consigliabile inserire il prodotto in una strategia di lotta che preveda l'alternanza di prodotti a base di spinetoram (JEMVELVA™ active) e spinosad (QALCOVA™ active) con altri prodotti contenenti sostanze attive aventi diverso meccanismo d'azione. Non impiegare DELEGATE 26 su popolazioni di insetti che hanno mostrato in passato resistenza a spinetoram (JEMVELVA™ active) o spinosad (QALCOVA™ active). Non effettuare più di due trattamenti consecutivi con prodotti contenenti spinosine ed evitare di trattare generazioni consecutive di insetti. Attenersi strettamente alle dosi riportate in etichetta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**, contattare: 00390372 709900 /709999 (O.U.)

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 12/03/2026

con validità: dal 30/03/2026 al 28/07/2026