

ERCOLE

Insetticida granulare adatto alla protezione degli apparati radicali di numerose colture erbacee ed orticole
Meccanismo d'azione IRAC: 3A

ERCOLE - Composizione:

- Lambda-cialotrina pura g 0,4
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a g 100

**TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE**

Sipcam Oxon S.p.A.
 Sede legale: via Mascheroni 5
 20123 - Milano
 Tel. 02-353781

PRODOTTO FITOSANITARIO

Autorizzazione Ministero della Salute
 n. 15901 del 01.10.2013

ATTENZIONE**Officina di produzione:**

SIPCAM OXON S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)
 SIPCAM INAGRA S.A. - Sueca (Spagna)
 Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)

Officina di confezionamento:

Kollant S.r.l. - Maniago (PN)
 Sinapak S.r.l. - Stradella (PV)

Distribuito da:

SIPCAM ITALIA S.p.A. - Via Sempione 195, 20016 Pero Milano
 ITAL-AGRO S.r.l. - Salerano sul Lambro (LO)
 ORVITAL S.p.A. - via Darwin 63, Settimo Milanese (MI)

Taglie 0.25-0.45-0.5-1-5-10-12-15-20-25-50 kg

Partita n.:**INDICAZIONI DI PERICOLO**

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti e indumenti protettivi.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Per proteggere gli uccelli il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo ai solchi. Rimuovere il prodotto fuoriuscito accidentalmente.

Utilizzare guanti, indumenti protettivi adatti e maschera respiratoria protettiva durante la fase di miscelazione e caricamento del prodotto. Utilizzare guanti e indumenti protettivi adatti durante la fase di applicazione.

Da applicare solo con trattore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando prepost-sinapticamente le terminazioni neuronali.

Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione.

AVVERTENZE: Consultare un Centro Antiveneni

CARATTERISTICHE

ERCOLE è un formulato insetticida a base di Lambda-cialotrina.

La molecola piretroide è dotata di lunga persistenza d'azione ed effetto repellente. Biologicamente attiva a bassi dosaggi, agisce per contatto ed ingestione, con rapido effetto abbattente su numerosi insetti terricoli quali Noctuidae (*Agrotis* spp., IAGROG), Elateridae (*Agriotes* spp., IAGRIG), Diabrotica larvae (DIABSP), Melolonthidae (Melolontha spp., IMELOG), Carabidae (*Zabrus* spp. IZABUG).

MODALITÀ, DOSI E CAMPI DI IMPIEGO

ERCOLE si impiega unicamente in campo, localizzato nel solco di semina o di trapianto, alla dose di 10-15 kg/ha, per la difesa delle seguenti colture. L'uso su **Mais** deve essere localizzato alla semina o distribuito interrato lungo la fila, entro la fase di rincalzatura del mais. L'uso su **Patata** deve essere localizzato alla semina o distribuito interrato durante la fase di rincalzatura.

COLTURA	FITOFAGI	DOSE
Mais	Noctuidae (<i>Agrotis</i> spp.), Elateridae (<i>Agriotes</i> spp.)	10-15 kg/ha
	Diabrotica larvae	12-15 kg/ha
Sorgo e Miglio	Noctuidae (<i>Agrotis</i> spp.), Elateridae (<i>Agriotes</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha
Fumento e orzo (primaverili e invernali)	Noctuidae (<i>Agrotis</i> spp.), Elateridae (<i>Agriotes</i> spp.), Melolonthidae (<i>Melolontha</i> spp.), Diabrotica larvae,	10-15 kg/ha
Avena e Segale	Carabidae (<i>Zabrus</i> spp.)	
Patata	Noctuidae (<i>Agrotis</i> spp.), Elateridae (<i>Agriotes</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha
Solanacee (Pomodoro, Melanzana, Peperone)	Noctuidae (<i>Agrotis</i> spp.), Elateridae (<i>Agriotes</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha
Legumi e Legumi secchi	Noctuidae (<i>Agrotis</i> spp.), Elateridae (<i>Agriotes</i> spp.), Melolonthidae (<i>Melolontha</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha
Soia, Cotone, Girasole	Noctuidae (<i>Agrotis</i> spp.), Elateridae (<i>Agriotes</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha
Cipolla, Aglio, e Scalogno	Noctuidae (<i>Agrotis</i> spp.), Elateridae (<i>Agriotes</i> spp.), Melolonthidae (<i>Melolontha</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha
Cucurbitacee a buccia edule (Cetriolo e zucchini), Cucurbitacee a buccia non edule (Melone, Anguria e Zucca)	Noctuidae (<i>Agrotis</i> spp.), Elateridae (<i>Agriotes</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha
Lattughe e insalate (Lattuga a cappuccio, Lattughe da taglio, tipo "Iceberg", Romana, Scarole, Cicorie, Radicchi, Indivie, Crescione, Rucola, Dolcetta, Barbarea,	Noctuidae (<i>Agrotis</i> spp.), Elateridae (<i>Agriotes</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha

Etichetta/foglio illustrativo

Senape juncea, Prodotti baby leaf comprese le brassicacee), Spinaci e simili		
Cavoli ad infiorescenza (Cavolfiori, Broccoli, Cime di rapa), Cavoli a testa (Cavoli verza, Cavoli cappuccio) ed altri	Noctuidae (<i>Agrotis</i> spp.), Elateridae (<i>Agriotes</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha
Colza, Carota, Tabacco, Barbabietola da zucchero, Semi di papavero	Noctuidae (<i>Agrotis</i> spp.), Elateridae (<i>Agriotes</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha
Sedano, Finocchio, Cardo e Rabarbaro	Noctuidae (<i>Agrotis</i> spp.), Elateridae (<i>Agriotes</i> spp.), Melolonthidae (<i>Melolontha</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha
Floreali ed ornamentali, Vivai di piante arboree	Noctuidae (<i>Agrotis</i> spp.), Elateridae (<i>Agriotes</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha
Colture porta-seme*	Noctuidae (<i>Agrotis</i> spp.), Elateridae (<i>Agriotes</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha

***destinate esclusivamente alla produzione di materiale riproduttivo (da seme): Cavoli ad infiorescenza, Cavoli a testa, Cucurbitacee, Lattughe e simili, Mais, Colza, Carota, Patata, Solanacee.**

COMPATIBILITÀ

Il prodotto si impiega da solo.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.