

SYLLIT[®] 544 SC



SYLLIT[®] 544 SC è un fungicida ad attività preventiva formulato in sospensione concentrata, caratterizzato da elevata adesività, uniformità di distribuzione sulla vegetazione e resistenza al dilavamento.

COMPOSIZIONE Dodina pura 52.9% (544 g/L)

FORMULAZIONE Sospensione concentrata






INTERVALLO DI SICUREZZA 7 gg per olivo; 14 gg per ciliegio; 28 gg per melo; 60 gg per pomacee (eccetto melo); 75 gg per pesco.

N° DI REGISTRAZIONE 15748 del 08.03.2018

CONFEZIONE L 1 - 5

INDICAZIONI DI PERICOLO **PERICOLO**
H302+H332 - H315 - H318
H410 - EUH208 - EUH401



COLTURE	AVVERSITÀ	DOSE (L/ha)	DOSE (mL/hL)	NOTE
 Pomacee (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo)	Ticchiolatura	1,25	85 - 625	I trattamenti vanno effettuati preventivamente dalla ripresa vegetativa sino a prima della raccolta. Può essere anche utilizzato in trattamenti curativi entro 24 ore dall'inizio dell'infezione. Su melo effettuare al massimo 2 trattamenti a distanza di almeno 7 giorni.
 Ciliegio	Cilindrosporiosi, Apiognomonìa	1,25	85 - 250	I trattamenti vanno effettuati preventivamente a partire dall'inizio della fioritura sino alla raccolta e anche dopo. Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di almeno 7 giorni.
 Pesco, Nettare e Ibridi simili	Bolla	1,65	110 - 330	I trattamenti vanno effettuati preventivamente a partire dalla fase dell'ingrossamento delle gemme sino alla caduta dei petali e/o dopo la raccolta a partire dal 50% di foglie cadute sino a completa caduta foglie. Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di almeno 7 giorni.
 Olivo (olive da tavola e da olio)	Lebbra, Occhio di pavone	1,25 - 1,65	125 - 165	Olivo (olive da tavola) I trattamenti vanno effettuati preventivamente in autunno solo dopo la raccolta. Effettuare al massimo 2 trattamenti per anno distanziati di almeno 7 giorni. Olivo (olive da olio) I trattamenti vanno effettuati preventivamente a partire dalla fase di sviluppo fogliare sino alla fine della fioritura e/o in autunno. Effettuare al massimo 2 trattamenti per anno distanziati di almeno 7 giorni.
 Pioppo in vivaio e in piantagione	Marssonina	1,3 - 1,65	165 - 260	I trattamenti vanno effettuati preventivamente da Giugno ad Agosto. Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di almeno 20 giorni.

- Azione indipendente dalla temperatura
- Resistenza al dilavamento
- Meccanismo d'azione specifico

