

ERADICOAT® MAX

Acaricida - Insetticida per orticole, agrumi, vite, fragola, mandorlo, noce, nocciolo, pistacchio, banana, mango, ananas, papaya, avocado, floreali ed ornamentali.

ERADICOAT® MAX è un acaricida-insetticida ad ampio spettro per il controllo di acari, eriofidi, afidi, psilla, cocciniglie ed aleurodidi. Nello specifico ERADICOAT® MAX agisce per azione fisica di contatto, bloccando l'insetto e portandolo alla morte in seguito all'ostruzione degli spiracoli tracheali. L'attività del prodotto può essere osservata già dopo 2-4 ore dall'applicazione. Per una corretta distribuzione del prodotto utilizzare volumi di acqua tali da assicurare una completa ed uniforme bagnatura della coltura da trattare, avendo cura di bagnare anche la pagina inferiore delle foglie e prestando particolare attenzione alla presenza di focolai di infestazione. Per avere la massima efficacia del prodotto si consiglia di trattare su vegetazione asciutta, nelle ore più calde e in giornate soleggiate. Una rapida asciugatura del prodotto consente una veloce immobilizzazione dell'insetto.



COMPOSIZIONE	FORMULAZIONE	MECCANISMO D'AZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Maltodestrina 40%	Concentrato solubile (SL)	Gruppo IRAC NC	Pericolo

REGISTRAZIONE: n. 18153 del 14/11/22 (Titolare della registrazione Certis Belchim B.V.)

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	TEMPO DI CARENZA
AGRUMI	Acari (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Panonychus citri</i> , etc.), Cocciniglie (<i>Planococcus</i> spp., <i>Icerya purchasi</i> , <i>Delottococcus aberiae</i>)	1-1,5 l/hl	
POMACEE (MELO, COTOGNO, NESPOLO)	Acari		
PERO	Acari, Psilla del pero (<i>Cacopsylla pyri</i>)	1,5-2 l/hl	
DRUPACEE (PESCO, NETTARINO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO)	Acari, Cocciniglie		
VITE DA TAVOLA E VINO	Acari eriofidi, Cocciniglie	1-1,5 l/hl	
POMODORO, PEPERONE, MELANZANA (PIENO CAMPO)	Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Acari (<i>Tetranychus urticae</i>)		
ZUCCHINO, CETRIOLO (PIENO CAMPO)	Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)		
MELONE, ANGURIA, ZUCCA (PIENO CAMPO)	Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Acari (<i>Tetranychus urticae</i>) Afidi		
LATTUGHE E INSALATE, FOGLIE DI SPINACI E SIMILI, ERBE FRESCHE (PIENO CAMPO)	Afidi	1,5-2 l/hl	
ASPARAGO	Acari		
FRAGOLA (PIENO CAMPO)	Acari		
FRUTTI DI PIANTE ARBUSTIVE, ALTRA PICCOLA FRUTTA E BACCHE (PIENO CAMPO, SERRA E TUNNEL)	Acari		
NOCCIOLO	Acari, Cocciniglie	1-2 l/hl	
MANDORLO, NOCE, PISTACCHIO	Cocciniglie	1-1,5 l/hl	
KIWI	Cocciniglie		
KAKI	Cocciniglie		
MELOGRANO	Afidi , Acari	1,5-2 l/hl	
FICO	Acari, Cocciniglie , Psille		
BANANA, MANGO, ANANAS, PAPAYA, AVOCADO	Cocciniglie	1-1,5 l/hl	
ORTICOLE (CON BUCCIA EDIBILE E NON EDIBILE, FLOREALI ED ORNAMENTALI (IN SERRA E TUNNEL)	Acari (forme adulte e giovanili), Afidi (forme adulte e giovanili), Aleurodidi (forme adulte, larve e uova)	2 l/hl	