

RIDOMIL GOLD 480 SL

Concentrato solubile

Fungicida sistemico per il controllo della peronospora su vite e delle colture orticole

Metalaxyl-M - Codice FRAC 4

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

metalaxyl-m puro g 44 (465,2 g/l)

coformulanti q.b. a g 100

contiene metalaxyl-m, acetophenone, heptan-2-one



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H302 Nocivo se ingerito. **H319** Provoca grave irritazione oculare. **H411** Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P264 Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso. P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

SYNGENTA ITALIA S.p.A.

Viale Fulvio Testi 280/6 - MILANO - Tel. 02-33444.1

Registrazione Ministero della Salute n. 18800 del 04/02/2026

Stabilimenti di produzione:

Chemark ZRT - Berhida - Peremarton Gyartelep (Ungheria)

SCHIRM USA Inc. - Ennis (Texas)

Syngenta Chemicals B.V. Belgium - Seneffe (Belgio)

Syngenta South Africa (Pty) Limited - Brits (Sud Africa)

Syngenta Production France S.A.S. - Aigues Vives (Francia)

Stabilimenti di confezionamento:

S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (RA)

TORRE S.r.l. - Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Syngenta Hellas Single Member S.A.C.I. - Enofyta (Grecia)

Stabilimenti di rietchettatura:

Arco Logistica - Via Battistella, 22 - Ferrara

Arco Logistica - Via Monari, 5 - Ferrara

Contenuto netto: ml 100 - 200 - 250 - 500 - 1 l - 5 - 10

Partita n. vedi corpo della confezione

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Metalaxyl-m: sintomi: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale.

Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.

In caso di malessere, consultare un medico per i consueti interventi di primo soccorso.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per arancio, mandarino, clementino, lime e pompelmo proteggere gli occhi e il viso durante la miscelazione, il caricamento e l'applicazione del prodotto.

Non effettuare applicazioni manuali in caso di piena vegetazione, es. quando non è possibile evitare il contatto con la superficie trattata.

In caso di rientro in campo, l'uso di guanti e indumenti da lavoro (pantaloni lunghi e maglia a maniche lunghe) è raccomandato per il lavoratore.

Per vite proteggere gli occhi e il viso durante la miscelazione, il caricamento e l'applicazione del prodotto. In caso di rientro in campo, l'uso di indumenti da lavoro (pantaloni lunghi e maglia a maniche lunghe) è raccomandato per il lavoratore. Il rientro in campo deve avvenire 1 giorno dopo l'applicazione.

Per melone, cocomero, pomodoro, cetriolo, lattughe e insalate, spinaci e simili, erbe fresche, broccolo, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza, cipolla e patata (impiego in campo) proteggere gli occhi e il viso durante la miscelazione, il carico e l'applicazione del prodotto. In caso di applicazioni manuali, indossare una maschera con filtrante FP2, P2 o similari, indumenti da lavoro (pantaloni lunghi e maglia a maniche lunghe) e guanti durante la miscelazione, il carico e l'applicazione del prodotto. In caso di rientro in campo, l'uso di guanti e indumenti da lavoro (pantaloni lunghi e maglia a maniche lunghe) è raccomandato per il lavoratore. Il rientro in campo deve avvenire 10 giorni dopo l'applicazione, in caso di uso su brassicacee.

Per melone, cocomero, pomodoro, cetriolo, lattughe e insalate, spinaci e simili, erbe fresche (impiego in serra): durante la miscelazione e il caricamento del prodotto indossare guanti e visiera. Durante l'applicazione del prodotto indossare indumenti impermeabili e guanti.

In caso di rientro in serra, l'uso di indumenti da lavoro (pantaloni lunghi e maglia a maniche lunghe) è raccomandato per il lavoratore.

Rientrare in campo quando la vegetazione è completamente asciutta.

CARATTERISTICHE

Ridomil Gold 480 SL è un fungicida ad azione preventiva e curativa. Il rapido assorbimento e la spiccata sistemica di Metalaxyl-M garantiscono una protezione pronta e prolungata sia della vegetazione presente al momento del trattamento, sia di quella di nuova formazione.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Culture	Malattie	Dosi/hl	Dosi/ha	Volumi di acqua l/ha	Modalità di applicazione
Vite (da vino e da tavola)	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	20 ml/hL	0,2 l/ha	-	Massimo 2 applicazioni ad intervallo di 7-10 giorni da inizio germogliamento
Arancio mandarino clementino lime pompelmo	Allupatura (<i>Phytophthora sp.</i>)	14 ml/hL	0,2 l/ha	-	Massimo 1 applicazione/anno dalla fase di allegagione
Patata (in campo)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	-	0,2 l/ha	300-600	Massimo 2 applicazioni/anno ad intervallo di 7-10 giorni da inizio germogliamento
Cipolla (in campo)	Peronospora (<i>Peronospora destructor</i>)	-	0,2 l/ha	200-800	Massimo 1 applicazione/anno dalla quinta foglia alla raccolta
Broccolo Cavolfiore Cavolo cappuccio Cavolo verza (in campo)	Peronospora (<i>Hyaloperonospora brassicae</i>)	-	0,2 l/ha	200-800	Massimo 1 applicazione/anno dallo stadio di prima foglia vera
Cetriolo (in campo)	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	-	0,2 l/ha	200-1000	Massimo 1 applicazione/anno a partire dallo stadio di terza foglia
Cetriolo (in serra)	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	-	0,2 l/ha	200-1000	Massimo 2 applicazioni/anno ad intervallo di 7-10 giorni a partire dallo stadio di terza foglia
Melone Cocomero (in campo e in serra)	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	-	0,2 l/ha	200-1000	Massimo 2 applicazioni/anno ad intervallo di 7-10 giorni a partire dal primo germoglio visibile
Lattughe e insalate Spinaci e simili Erbe fresche (in campo e in serra)	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	-	0,2 l/ha	200-800	Massimo 1 applicazione/anno dallo stadio di prima foglia vera
Pomodoro (in campo)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	-	0,2 l/ha	300-1000	Massimo 2 applicazioni/anno ad intervallo di 7-10 giorni dallo stadio di quinta foglia
Pomodoro (in serra)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	20 ml/hL	0,2 l/ha	-	Massimo 2 applicazioni/anno ad intervallo di 7-10 giorni dallo stadio di quinta foglia

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 04/02/26

Adottare quantitativi d’acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione trattata, evitando lo sgocciolamento. Le dosi hl sono valide in caso di utilizzo di un volume di acqua:

- vite: 1000 litri/ha.
- arancio, mandarino clementino lime pompelmo: 1500 litri/ha
- pomodoro in serra: 1000 litri/ha

Nel caso di utilizzo di volumi di impiego più bassi (es. bassi volumi), fare riferimento alla dose/ha, utilizzando un volume di acqua non inferiore a 200 l/ha per vite e arancio, mandarino, clementino, lime, pompelmo e 300 l/ha per pomodoro in serra.

Fitotossicità: il prodotto è generalmente selettivo per le colture indicate in etichetta; nel caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione, si consiglia di effettuare saggi preliminari su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

Compatibilità

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d’intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Strategia antiresistenza

Ridomil Gold 480 SL contiene la sostanza attiva metalaxil-m che appartiene al gruppo 4 del FRAC.

Il prodotto deve essere applicato preventivamente e sempre in miscela con fungicidi a diverso meccanismo d’azione per il controllo della peronospora e dell’allupatura.

Per una corretta difesa fungicida, si raccomanda sempre di seguire le linee guida FRAC specifiche per colture e patogeno.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta:

Cavolo cappuccio, cavolo verza	30 giorni
Broccolo, cavolfiore, vite	20 giorni
Arancio, mandarino, clementino, lime, pompelmo, cipolla, patata, cetriolo (in serra)	14 giorni
Lattughe e insalate, spinaci e simili, erbe fersche	10 giorni
Cetriolo (in campo), melone, pomodoro, cocomero	3 giorni

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 04/02/26